




Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.6.42








Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.6.42





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.6.42



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Ald.1.6.42



*Alto. 1/6.*



*Ex Libris Joannis Nencini*  
*1874*





















# CLAVDII PTOLEMAEI

LIBER DE ANALEMMATE,

A Federico Commandino Vrbinatē instauratus,  
& commentariis illustratus,

Qui nunc primum eius opera e tenebris in lucem prodit.

Eiusdem Federici Commandini liber  
de Horologiorum descriptione.



RŌMAE, M. D. LXII.

Apud Paulum Manutium Aldi F.

*Ex bibliotheca Ptolomaei.*  
*Richelmi.*



ETIAM PTOLEMAEI  
LIBER DE ASTRONOMIA  
Ptolemaei Claudii  
Philosophi Mathematici  
et Astronomi  
Aegyptii  
et Alexandrini  
de Astronomia  
et Meteorologia



ROMAE M. D. LXXI  
Apud Joannem Manentium A. M. F.

in Aedibus



RANVTIO FARNESIO,  
CARDINALI AMPLISSIMO,  
ET OPTIMO.

MARCELLVS Ceruinus adhuc Cardinalis, paucis ante annis, quàm altissimum Reipublicæ Christianæ gradum obtineret, duos libellos, unum Archimedis de iis, quæ in aqua uehuntur, alterum Ptolemæi de analemmate, latine redditos e diuturna obscuritate, in qua latuerant, euoluedos curauit: meq; , qui tantum uirum unice diligebam, & obseruabam, eo munere pro sua liberalitate dignum existimauit. Cui diuino Pontifici (quod ad libellum Ptolemæi de analemmate attinet) studiosi homines, & ii maxime, qui mathematicis disciplinis delectantur, tanti beneficii memoria sempiterna se obstrictos esse libentissime prædicabunt, & fatebuntur; si, ut spero, præclarissima scientia, & ab humanis rationibus non aliena post sexcentos annos reuiuiscere cœperit. Veteres enim mathematici de gnomonicis quidem rationibus accuratissime conscripserunt: pluraq; posteris tradiderunt, quæ ad eas scientia, & cognitione comprehendendas attinerent. uerum uel temporum iniuria, uel hominum negligentia factum est, ut nulla super hac materia tot clarorum  
\* ii uirorum



uirorum monumenta ad manus nostras peruenerint. nam Vitruuius, quem omnia eorum scripta legisse, uel potius deuorasse intelligimus, cum de architectura scribens in hunc sermonem de analemmate, ac gnomonicis rationibus incidisset, principia solum attigit, reliquas partes inchoatas, & imperfectas reliquit. hæc est causa, cur nostræ memoriæ mathematici non exactam, nec exquisitam nobis rationem solaria horologia describendi tradiderunt; sed tenui quadam obseruatione, atque animaduersione contenti, pauca solum præceperunt, quæ uel nullis rationibus confirmentur, uel certe a nobis non sine maximo negotio, maximaq; temporis iactura effici possint. nam si ueram analemmatis rationem ex ueterum monumentis inuestigare ualuissent, multo faciliorem nobis aditum ad huiusmodi facultatem patefecissent. Cum igitur hunc Ptolemæi librum de analemmate quam diligentissime legissem, eiusq; dignitatem cum non mediocri utilitate coniunctam facile perspexissem, existimaui me Marcelli Pontificis Maximi memoriæ præclare consulturum, & mathematicarum disciplinarum studiosis gratissimum esse facturum, si pro mea uirili parte laborassem, ut edito tam præclaro, tam utili libro per me aliqua lux afferretur. græcum enim codicem non habemus: et is, qui de græco conuertit, ob materiæ, in qua uersabatur, obscuritatem, cymeterias, ut ita dicam, tenebras lectoribus offudit. præterea



ne-  
ipta  
m de  
ana-  
isset,  
patas,  
nostra  
exqui-  
tiben-  
ione,  
m pra-  
rmen-  
gorio,  
nam si  
onu-  
orem  
efecif-  
ana-  
q; di-  
ntam  
Pon-  
rum,  
gratit  
labo-  
o per  
licem  
t, ob  
yme-  
ta pra-  
terea

terea nō nullis in locis non solum uerba, sed etiam  
integræ periodi desiderantur : non nulla autem,  
quæ extant, ita deprauata sunt, ut ad elicienda  
tanti uiri sensa uates potius, quàm interpretes requi-  
ratur. Accedit, quod Ptolemæus, qui ea tantum,  
quæ ipse superiorum inuentis addidit, firmissimis  
argumentationibus comprobat; quæ autem ab  
iisdem recte dicta sunt, omiſſis probationibus fa-  
tis habet collaudare; doctissimis etiam hominibus  
multis de rebus dubitandi locum reliquit. Cum  
hæ difficultates cōsiliū meum impedire, aut cer-  
te retardare potuissent: tamen, ut in tam honesta,  
tam fructuosa disciplina, eorum, quos supra scrip-  
psi, commodis inferuirem, hoc onus mihi omni-  
no suscipiendum esse duxi. quamobrem primum,  
ne subiectæ rei obscuritas, & interpretis inscitia  
quēquam ab huius libri lectione deterrere posset,  
obscuriores locos commentariis quibusdam illu-  
strauī; deprauatos, quantum coniectura sum asse-  
cutus, restitui, ac correxi: deinde quæcunque de-  
erant, iis supplui, quæ cum antecedentibus Pro-  
lemæi sententiis consentire iudicaui. quamuis ni-  
hil pro certo affirmauerim, sed tantummodo quid  
sentirem exposuerim, & ad nouæ academix imi-  
tationem, quod mihi probabilius uisum est, id  
in medium attulerim. Hæc eo dico, ne, si unquam  
græcus codex emendatus exhibit, & aliter, ac ego  
fensi, scriptum reperietur, maleuoli homines hūc  
meum laborem arrogantix condemnare possint;  
prafer-



præfertim cū neque ambitione, quæ a natura mea  
longe alienissima est, nec auaritia ductus ad hoc  
negotiū sim aggressus: sed aliorū studia uel adiu-  
uare, uel incendere uoluerim. tum ne quid a me  
studiosi requirerent, quod mathematicæ discipli-  
næ postularent, nihil uel a Ptolemæo sine probatio-  
ne dictum, uel a me declaratum est, quod certif-  
simis argumentis, quas ἀποδείξεις Græci uocant,  
non confirmauerim. Postremo quoniam hic liber  
potius in contemplatione, quàm in effectiōe uer-  
sari uidetur, ne hanc quidem partem mihi præ-  
termittendam esse statui, uerum omnem diligen-  
tiam adhibui, ut quàm facillime ac breuissime fie-  
ri posset, rationem uarias horologiorum solarium  
formas efficiendi explicarem; quòd sine hac man-  
cam, & quodam modo imperfectam esse tam præ-  
claræ disciplinæ cognitionem mihi persuasi. Hos  
meorum studiorum fructus tibi potissimum Ranu-  
ti Cardinalis amplissime iure optimo dicare con-  
stitui. nam ex eo tempore, quo me primum in  
clientelam, & familiaritatem tuam recepisti, tot  
mihi amoris ac beneuolentiæ signa impertisti, ut,  
si ingrati animi crimen effugere uelim, quantum  
litteris, quantum studiis, & præcipue mathema-  
ticipis consequi possim, id omne ad arbitrium tuū  
libentissime conferre debeam. accedit excellens  
ingenium tuum, & in omni disciplinarum genere  
singulare iudicium, quod ex assidua optimorum  
scriptorum lectione consecutus es. cum enim a  
prima



prima ætate studium tuum, & operam in omnibus  
ingenuis artibus posueris, quæ tibi, adiuncto etiam  
rerum usu, honestissimum aditum ad maxima im-  
peria gubernanda compararunt, factum est, ut  
tam *πρακτικὴν*, quàm *θεωρητικὴν* uitam amplexa-  
tus, in utroque genere Reipublicæ Christianæ cu-  
mulate satisfeceris, & in singulos dies satisfacias.  
quo nomine etiã hi mei labores amplitudini tuæ  
merito debentur, quòd tu, qui nullam diei par-  
tem uel a studiis litterarum, uel a publicis nego-  
tiis uacuum intermittis, faciliorem distribuendi  
temporis rationem ex hac gnomonica disciplina  
percipies. quapropter si tuo acerrimo iudicio ea,  
quæ a me in eam scripta sunt, comprobabis, mihi  
exploratissimum est, neminem fore, qui tuæ  
grauissimæ sententiæ non assentiatur. Vale, & a  
Commandino tuo libellum etiam Archimedis de  
iis, quæ in aqua ueluntur, & emendatiorem, &  
fortasse illustriorem propediem expecta.

Amplitudinis tuæ studiosissimus,

Federicus Commandinus.



primus... secundus... tertius...  
quartus... quintus... sextus...  
septimus... octavus... nonus...  
decimus... undecimus... duodecimus...  
tredecimus... quattuordecimus... quindecimus...  
sexdecimus... septendecimus... octodecimus...  
nondecimus... viginti...  
viginti... triginta...  
triginta... quadraginta...  
quadraginta... quinquaginta...  
quinquaginta... sexaginta...  
sexaginta... septuaginta...  
septuaginta... octoginta...  
octoginta... nonaginta...  
nonaginta... centum...



CLAVDII PTOLEMAEI  
LIBER DE ANALEMMATE,  
CVM COMMENTARIIS FEDERICI  
COMMANDINI VRBINATIS.

C ONSIDERANTI mihi, Syre,  
ex angulis, qui circa gnomonis  
locum accipiuntur, qui ratio-  
ni consentanei essent, & qui  
minime, uenit in mentem scientiam qui-  
dem uirorum illorum in geometricis ad-  
mirari, etiam in his; & mirifice amplexari,  
non autem in omnibus contendere. Ita-  
que eam, quæ est secundum naturam in  
methodis, consecutionem, rebus ipsis tan-  
tum non clamantibus, naturali philoso- \*  
phiæ opus esse aliqua sumptione magis ma-  
thematica, itemq; scientiæ mathematicæ,  
aliqua magis naturali, nullo modo impro-  
bauimus: neque enim hoc est eius, qui uia,  
ac ratione discere cupiat: immo uero maxi- \*  
me cauédū est, ne propter eiusmodi opinio-  
nem unaquæque tractatio aliqua ex parte  
fiat imperfectior. Quæ ergo ad hanc rem  
A perti-



## PTOLEMAEVS

pertinere pro certo cognoui, ea ad te misi:  
\* quanquam summatim conscripturus sum,  
si quid tibi ad intelligentiam, rationemq;  
positionum, & ad usum, qui per analem-  
ma comparatur, uidear attulisse.

Quoniam igitur dimensiones, quæ in  
unaquaque mole insunt, terminatas esse  
oportet, & positione, & multitudine, si-  
cut & magnitudine: ex omnibus autem de-  
clinationibus, quæ fiunt ad rectos angulos,  
solæ hoc modo se habent; omnes enim aliæ  
& specie interminatæ, & numero infinitæ  
sunt: sequitur tres solas esse tales in una  
quaque mole demensiones, quoniam & so-  
\* læ tres rectæ lineæ ad rectos inter se angulos  
constitui possunt: plures non possunt.

## COMMENTARIVS.

\* ANTIQVOS mathematicos de gnomoni-  
cis rationibus conscripsisse ex Vitruuio, Ptole-  
mæoq; satis constat. quorum inuentis cum Ptole-  
mæus nō nulla addidisset: non nulla etiam immu-  
tasset, eorum omnium explicationem hoc libel-  
lo



lo complexus est, qui de analemmate inscribitur. Analemma enim appellarunt cælestis sphaeræ speciem, & formam quandam in plano descriptam, communem uidelicet sectionem meridiani, & aliorum circularum, adiunctis parallelorum semicirculis. ex qua dierum quantitates, umbrarumq; gnomonis rationes, & alia quæcunque ad horologiorum descriptionem necessaria sunt, facile deprehenduntur. Itaque quoniam circularum, quos in sphaera intelligimus, positiones & inclinationes dimetiri oportet, idq; per lineas perpendiculares, quæ terminatæ ac definitæ sunt: primum ostendit Ptolemæus tres tantum esse dimensiones, iisdem fere argumētis, quibus usus est in libro de dimensione, ut ex Simplicii commentariis apparet in primum librum Aristotelis de cælo, cuius hæc sunt uerba: *Ισως ἐν ἐκ τῶ μὴ εἶναι ἑτέραν δξασιν δεικνὺς τὸ ξιγὴ δξαστὸν πάντῃ δξαστὸν εἶναι, ἐπιχρήμασι ξισὶν ὅς ἐνδοξὼν ἐχρήσατο. ὁ δὲ Φωμάσιος Πτολεμαῖος ἐν τῇ μονοβύβλῳ περὶ δξασάσεως καλῶς ἀπέδειξεν, ὅτι ἐκ εἰσὶ πλείους, τῶν ξιῶν δξασάσεων, ἐκ τῶ δὲ εἶν μὲν τὰς δξασάσεως διωρισμένας εἶναι, τὰς δὲ διωρισμένας δξασάσεως κατ' ὁρθὰς καὶ ἑτέρας λαμβάνεσθαι, ξεῖς δὲ μόνως πρὸς ὁρθὰς ἀλλήλαις γωνίας ὁρίσας δυνατὸν εἶναι λαβεῖν, δύο μὲν καὶ ἂς τὸ ἐπίπεδον ὁρίζεται, ξίτην δὲ ἢ πρὸς τὸ βάθος κατὰ μέξει. διὸ εἰ πρὸς ἑσὰ μετὰ τὴν ξίτην δξασασιν ἑτέρα, ἀμέξος αὖ εἴη πάντως καὶ ἀδιόριστος. τὸ μὴ εἶναι ἐν εἰς ἑτέραν μέγρος μεταβλῶαι, ὁ μὲν Αριστοτέλης ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς φαίνεται λαβεῖν, ὁ δὲ Πτολεμαῖος ἀπέδειξεν.* Fortasse igitur, inquit Aristote-



# PTOLEMAEVS

les, cū non sit alia dimensio, id, quod triplici ratione diuiditur, omni ex parte diuidi posse ostendit, tribus argumentis usus ex iis, quæ probabilia sunt. At diuinus Ptolemæus in unico libro, quem de dimensione edidit, perpulchre demonstrat, non esse plures, quàm tres dimensiones: propterea quòd necesse sit, ipsas terminatas esse. terminatæ autem dimensiones secundum perpendiculares rectas lineas accipiuntur. neque enim fieri potest, ut plures, quàm tres lineæ ad rectos inter sese angulos aptentur; duæ quidem, quibus terminatur superficies; tertia uero, quæ crassitudinem metitur. Quòd si præter tertiam alia quæpiam dimensio detur, infinita ea prorsus, atque interminata erit. non esse igitur aliam dimensionem, Aristoteles quidem ex inductione sumpsisse uidetur, Ptolemæus uero demonstratione confirmauit.

Ex omnibus autē declinationibus, quæ fiunt ad rectos angulos, solæ hoc modo se habent.

INTERPRES declinationis nomen usurpauit pro eo, quod commune esset inclinationi, & erectioni, quæ est ad perpendiculum. dicitur enim lineæ ad planum, & plani ad planum inclinatio, quæ græce κλίσις. rursus linea ad planum perpendicularis dicitur, seu ad perpendiculum erecta, græce ὀρθή: & planum ad planum erectum ad perpen-



DE ANALEMMATE. 3

perpēdiculum, græcis ὀρθόν. sed quod græci ὀρθόν,  
nos aptius, ut opinor, latine rectum dicemus.  
Cicero enim ad Q. fratrem scribens, columnas,  
inquit, neque rectas, neque e regione Diphilus col-  
locarat, eas scilicet demolietur; & aliquando per-  
pendiculo, & linea discet uti.

Quamobrem & in sphæra solæ tres dia- A  
metri constituuntur inter sese ad rectos an-  
gulos: & maximi circuli ex iis, qui in mun-  
di sphæra describuntur, soli tres in recto an-  
gulo declinationes inuicem faciunt. quo-  
rum unus quidem intelligatur distinguens  
hemisphærium, quod sub terra est, ab eo,  
quod supra terram, quem horizontem dici-  
mus: secundus distinguens orientale hemi-  
sphærium ab occidentali, qui meridianus ap-  
pellatur: tertius autem, & reliquus intelli-  
gatur septentrionale hemisphæriū separans  
ab eo, quod est ad meridiem, qui secun-  
dum uerticem, seu uerticis dicitur. Et dia-  
metrorum, quas diximus, communis qui-  
dem sectio circuli horizontis, & meridiani  
uocatur meridiana: communis sectio me-  
ridiani, & uerticis gnomon: uerticis au-  
tem, & horizontis communis sectio æqui-  
noctialis



PTOLEMAEVS

noctialis uocetur: quoniam & æquinoctialis ipsius, & illorum communis sectio est. Translatis igitur una cum sole his circulis circa communes sectiones manentes, ueluti circa axes, duos motus intelligere possumus: horizontis quidem circa æquinoctialem diametrum, tanquam ad id, quod supra terram, & sub terra est; & circa meridianam, tanquam ad orientem, & occidentem solem; meridiani circa meridianam diametrum, ut ad ortum, & occasum; & circa diametrum gnomonis, ut ad septentrionem, & meridiem: uerticalem autem circa diametrum gnomonis, ut ad septentrionem, & meridiem; & circa æquinoctialem, ut ad id, quod supra terram, & sub terra. Sed quoniam fieri non potest, ut idem simul duobus motibus cieatur, priorem eorum motuum, ut pote magis conuenientem unicuique tribuamus. horizonti quidem eum, qui est circa æquinoctialem diametrum, ut rursus finiat positionem ad id, quod sub terra, & quod supra terram: meridiano eum, qui circa meridianam, ut notet disiunctionem

nem



DE ANALEMMATE.

4

nem, quæ est ad ortû, & occasum: at uerticali eum, qui circa gnomonem, ut ostendat transitum ad septentrionem, & meridiem. Itaque horizontis quidem motus facit circulum, quem uocamus hectemorion; quia altitudinem usque ad sextam horam com-  
mōstrat; motus meridiani circulum, quem horarium appellamus, quòd singularum horarum spatio comitetur. uerticalem autē motus circulū facit, qui κατὰ βάνος, id est descēsiuus nominatur: quoniā descensum ab altissima parte ad humillimā declarat. Rursus unusquisque horum circulorum, dum una cum solis radio supra terram fertur, duas efficit declinationes, quibus datis & positio radii determinatur, quòd una satis non sit. earum altera rectis lineis continetur, delata scilicet & manēte, hoc est solis radio, & diametro, circa quam fertur: altera continetur ipsis planis, itidem delato, & manente; ita ut utriusque eorum una tantum declinatione data, positio etiam radii definiatur. Ex angulis autem, qui ab hectemorio circulo fiunt, eum quidem, qui con-

tinetur

*Hectemorion  
est motus horis  
altitudinis qm  
horarium motu  
meridiani*

*Descensiuus  
a uerticali qm descen-  
dit a uertice a uertice  
ostendit*

*Declinationes  
differentias, una inter  
seas radij et axis  
sup qua mouetur  
at hanc interplan-  
etiam motu ex ma-  
notis. quibus*

*Cumque positio  
est anguli duo in  
quoque circulo*



PTOLEMAEVS

tinetur radio , & diametro æquinoctiali,  
non uidemus antiquos mathematicos in  
locum gnomonis recepisse: cum uero , qui  
declinatione ipsius ad horizontem contine-  
tur, uocant hectemorion . At ex angulis a  
circulo horario factis, qui ex radio , & dia-  
metro meridiani constat, horarium, & qui  
ex declinatione ipsius ad meridianum, ap-  
pellant angulum in plano uerticalem . quin  
etiam angulorum, qui a circulo descensiuo  
sunt, unus quidem radio , & gnomone, al-  
ter declinatione ipsius ad uerticalem conti-  
netur . uerum antiqui non his, sed pro an-  
gulo quidem , qui ex gnomone , radioq;  
constat, utuntur reliquo, qui perficit an-  
gulum rectum, & descensiuum uocant. pro  
angulo autem, qui constat ex declinatione  
ipsius ad uerticalem, utuntur eo, qui a de-  
clinatione eiusdem ad meridianum effici-  
tur; & græce uocant ἀντίσειον . Sextum angu-  
lum inferunt pro relicto, eum scilicet, qui  
fit ab æquinoctiali diametro, communiq;  
sectione circuli horarii, & æquinoctialis,  
quem uocant angulum in æquinoctialis  
plano.

*Angulus Hectemorion  
est antiquos  
huius horarii*

*Angulus in plano  
verticali*




# DE ANALEMMATE.

5

plano. Sed cum æquinoctialis circulus non  
feruet in quolibet climate eandem positio-  
nem, alio atque alio modo se habent & ho-  
rizon, & meridianus, & uerticalis. Vt au-  
tem sub aspectum magis cadat angulorum  
consequentia, & id, quod supra posuimus:  
fit meridia-

nus circu-  
lus a b g d,  
& recti ad  
ipsum oriẽ  
tales semi-  
circuli, ho-  
rizõtis qui-  
dem a e b,  
uerticalis  
autẽ g e d:




& data positionẽ radii alicuius ad punctum  
z, describantur per ipsum trium circulorũ  
orientalis semicirculi, delati una cum ra-  
dio circa proprias diametros, horizontis  
quidem a e b facti hectemorii semicirculus  
h z e t circa diametrum, quæ transit per e &  
per punctum sibi è regione oppositum: me-

B      ridiani



PTOLEMAEVS

ridiani a g b, facti horarii semicirculus a z k  
b, circa diametrũ per a & b: ipsius autẽ g e d  
uerticalis facti descensui semicirculus g z d  
circa diametrum, quæ per g & d ducitur. &  
accipiantur angulorum differentia in peri-  
pheriis propriorum circularum, unicui-  
que subtẽ-  
fis, propter  
simplicio-  
rẽ demon-  
strationẽ.  
angulis qui  
dẽ, quos di-  
cebamus  
cõtineri ra-  
dio, & axe  
peripheriæ  
subtẽdũtur ze hectemorii peripheria; z a ho-  
rarii: & z g descensui. angulis uero, qui  
fiunt a declinationibus planorum, manen-  
tis circuli, & eius, qui ipsum transcendit,  
subtenduntur a h meridiani peripheria de-  
clinationem horizõtis, & hectemorii con-  
tinens; g k uerticalis peripheria continens  
decli-



*quomodo anguli  
differentie colliguntur  
a declinationibus  
non ad radios*

*Anguli a declinationibus  
omnibus planorum  
manentis in motu*



DE ANALEMMATE. 6

declinationem meridiani, horariiq; & el  
peripheria horizontis, declinationem uer-  
ticalis, & descensui. Itaque cum hæc con-  
sequencia subiiciat angulosq; & peripherias  
conuenientes naturæ circulorum, unam in  
unoquoque manentium, & delatorum,  
antiqui peripheriam quidem e z hec-  
temorii prætermiserunt, ut diximus, ponen-  
tes pro ipsa, quam uocant in æquinoctia-  
lis plano: peripheriam uero a z seruant, uo-  
cantq; proprie horariam: & pro g z ipsam  
z l assumpserunt, descensiuam nominantes,  
rursus ipsam quidem a h retinent, & uocāt  
hec temorion. similiter & g k, quam uocant  
in plano uerticis. loco uero ipsius el assu-  
munt a l, quam antiscion appellant. qua  
igitur ratione in iis, quæ ponuntur, ab an-  
tiquis differamus, liquido constat.

COMMENTARIUS.

STATIM ad ea, quæ huius tractationis pro-  
pria sunt, accedit Ptolemæus, exemplo usus cir-  
culorum, quos in mundi sphaera intelligimus. in  
ea enim tres circuli tantum inter sese ad rectos an-  
gulos constituuntur, horizon, meridianus, &

B ii uer-

*quia horarii fin  
& hec temorii meridiani  
a uertice  
quia hec temorii  
fin æquinoctialis*

*Confessatur autem in  
2 de signorum recep-  
tionibus sup æthero  
folio dimittit*



uerticalis. ex quo & communes ipsorum sectio-  
nes inter se perpendiculares sunt, quæ diametri  
appellantur. æquinoctialis quidem communis se-  
ctio horizontis, & uerticalis, itemq; ipsius æqui-  
noctialis circuli, a quo nomen traxit: meridianam  
communis sectio meridiani, & horizontis: qui  
uero gnomon dicitur, uerticalis, ac meridiani  
communis sectio est. Cum igitur hi circuli in qua-  
libet cæli inclinatione fixi, ac stabiles sint, adhi-  
bet Ptolemæus totidem alios mobiles, qui una  
delati semper solem comitentur: ita ut horizon  
mobilis, quem hectemorion uocant, conuertatur  
circa æquinoctialem diametrum: meridianus mo-  
bilis, qui horarius appellatur, circa meridianam:  
& uerticalis mobilis, quem descensuum dicunt,  
circa gnomonem.

**B** Itaque horizontis quidem motus facit  
circulum, quem uocamus hectemorion.

**I**N translatione legitur hectemorion. Sed quo-  
niam Olympiodorus in commentariis in tertium  
librum meteororū Aristotelis huius circuli men-  
tionem facit, quem ἐκτημόριον appellat, nos hec-  
temorion scribere maluimus. Olympiodori uerba  
hæc sunt. ὅτι γὰρ καὶ ὀρίζων κινέμενος ἐν τῇ σφαίρᾳ. καὶ  
τὸ οἶδεν ὁ Πτολεμαῖος. τὸν γὰρ τοῖτον ὀρίζοντα, ἐκτημό-  
ριον ὀνομάζει διὰ τὸ ἐξ ἡμέρας λαμβάνειν τῆς ἡμέρας. ἐστὶ γὰρ  
ἡ περὶ τῆς β' ὥρας. καὶ ἡ δ' ἑτέρα, ἰά. καὶ ἐξ ἧς ἴσαί. καὶ ἕτος  
ὁ κύκλος κατὰ τὰς ὥρας τὰς αὐτὰς τὴν αὐτὴν ἵχει. ἡμέραν.  
est



DE ANALEMMATE. 7

est enim, inquit, & horizon, qui in sphæra mouetur. atque hoc ne Ptolemæo quidem ignotum fuit, qui eiusmodi horizontem hectemorion appellat: propterea quod sex positiones in die assumit, est autem prima duodecimæ horæ, & secunda undecimæ, & deinceps æquales. atque hic circulus in eisdem horis eandem habet positionem.


Rursus unusquisque horum circularū, C  
dum una cum solis radio supra terram fertur, duas efficit declinationes.

CIRCVLORVM enim mobilium unusquisque cum a proprio, & manente circulo una cum sole recesserit, duos constituit angulos, unū quidem ex rectis lineis, radio scilicet solis, & diametro, circa quam fertur: alterum uero ex ipsis circularum planis, mobili, & manente, quorum uterque necessario requiritur, si positio radii recte determinanda sit. Sed ut omnia, quæ hoc loco dicuntur, sub aspectum ueniant: Sit meridianus circulus  $a b c d$ , circa centrum  $e$ : & ad ipsum recti intelligantur horizon  $a f c g$ , & uerticalis  $d k f b g$ , posito autem sole in  $h$ , sit meridiani mobilis, hoc est horarii circulus,  $a h k c o$ : horizontis mobilis, hectemorii scilicet  $l h f m g$ : & uerticalis mobilis, qui descensiuus dicitur,  $d h n b p$ : ita ut  $h$  sit punctum, in quo mobiles circuli sese secant: sintq; puncta  $f g$  in quibus horizon secat uerticalem, & hectemorion.  $K o$ , in quibus horarius uerticalem:



# PTOLEMAEVS

uerticalem : & n p, in quibus descēsiuus horizon-  
tem secat . iunctisq; h e, k e, n e, producat k e  
usque ad alteram circumferentiā horarii, & uer-  
ticalis partem in o : & n e ad alteram partem cir-  
cunferentiā descensui, & horizontis in p . erit  
angulus descensui ex rectis lineis constans h e d,




hoc est radio, & gnomone, cui subtenditur ipsius  
circunferentia h d . angulus uero ex circularum  
planis, manente scilicet d k f b g, & mobili d h n  
b ipse n e f, cui horizontis circumferentia n f, sub-  
tenditur .



tenditur. atque earum circumferentiarum utraque necessario adhibetur ad positionem radii determinandam, ut in horizontis plano, ad quod ipsi circuli, uerticulis & descensuius recti sunt. nam reliqua pars circumferentiæ descensui  $d h$ , quæ perficit quartam circuli, hoc est ipsa  $h n$ , metitur altitudinem solis supra horizontem: qua gnomonis umbræ longitudo definitur. circumferentia uero horizontis  $n f$ , ostendit distantiam solis horizontalem, quam uocant, nobis liceat solis latitudinem appellare: & umbræ latitudinem eam, quæ ipsa designat. iacitur enim umbra ad partes ex diametro oppositas ipsi  $n$ , hoc est ad partes  $p$ . quæ quidem fortasse causa fuit, cur antiqui mathematici non ipso  $d e h$ , sed reliquo angulo  $h e n$ , qui rectum perficit, usi sunt: quem descensuum nominarunt, nāque ei subtenditur circumferentia  $h n$  solis altitudinem commonstrans. pro angulo autem  $n e f$ , usi sunt ipso  $a e n$ , qui & circulorum planis continetur, meridiani, & descensui: appellaruntq; antiscion, quod ad contrariam partem, ut diximus, gnomonis umbra proiicitur. At in circulo horario angulus, qui ex rectis lineis constat, radio scilicet, & diametro meridiana, erit  $h e a$ , cui subiicitur ipsius circumferentia  $a h$ , hunc & antiqui horarium uocant. angulus autem ex circulorum planis, meridiani, & horarii erit  $k e d$ , cui subiicitur uerticulis circumferentia  $d k$ . eū antiqui in uerticulis plano nominant, & earum circumferentiarum



rentiarum utraque necessaria est, ut positio radii determinetur: ueluti in plano uerticulis, ad quod & meridianus, & horarius recti sunt: quoniam reliqua pars ipsius a h, quæ quartam circuli complet, hoc est h k solis altitudinem supra dictum planum ostendit, & circumferentia d K,



distantiam eius uerticalem, quam nos & latitudinē in uerticali circulo dicemus. quibus & gnomonis umbræ longitudo, & latitudo circumscribitur: uergit enim umbra ad partes o, è regione ipsi K.  
Denique



# DE ANALEMMATE. 9

Denique in circulo hectemorio angulum hef, ex rectis lineis constantem, nempe radio, & diametro æquinoctiali antiqui prætermiserunt: ael uero ex circulorum planis, horizontis, & hectemorii, hectemorion appellarunt: quorum uterque ad radii positionem requiritur. ut in meridiani plano, reliqua circumferentia ipsius fh, quæ primo angulo subtenditur, uidelicet hl, solis altitudinẽ supra eiusmodi planum ostendit: circumferentia uero meridiani al, quæ subtenditur alteri, eiusdem distantiam meridianam, seu latitudinem declarat, quibus gnomonis umbræ longitudo, latitudoq; definitur.

Quoniam autẽ omnis angulus facit aliquas magnitudines ex utraque parte declinationis, interdum quidem æquales, ut in positione recta; interdum uero inæquales, ut in reliquis; necessarium omnino erit & in angulis expositis, aut peripheriis determinari principium in unaquaque specie, a quo acceptiones, & contrariæ declinationes, quæ ad ortum, uel occasum, & quæ ad septentrionem uel meridiem fiunt. Cum igitur nobis propositum sit acceptiones, expositiones, & nomina peripheriarum ostendere, iuxta ordinem a ratione produ-

C etum



*Peripherie mobiles*  
*Hectemorion*  
*Horizon*  
*Descensiva*  
*meridiana*  
*Meridiana*  
*Horizon*  
*et Verticalis*

PTOLEMAEVS

Etum: consequens est, ut determinatio propria in unaquaque specie assignetur. nomina enim imponimus ab ipsis circulis, quorum sunt peripheriae: & uocamus eas quidem, quae in iis, qui mouetur, insunt, hectemorias, horarias, & descensiuas: eas autem quae in manentibus, similiter meridianas, uerticales, & horizontales.


COMMENTARIVS.

CVM in superioribus Ptolemæus sex circulos assumpserit in sphaera; propositæ rei inseruientes, tres fixos, stabilesq; & totidem mobiles: quorum unusquisque stabilis cum suo mobili duos angulos constituit: erunt omnes anguli numero sex; & sex circumferentiae, quae ipsis angulis subiiciuntur. itaque primo earum circumferentiarum nomina ostendit: deinde acceptiones, uidelicet qua ratione accipiantur ex analémate: postremo expositiones, ut ipse appellat, quo pacto scilicet, & quo ordine exponantur, & in proprias tabulas digerantur. Nomina igitur imponit ab ipsis circulis, quorum sunt circumferentiae: ut in proposita figura, circumferentia hectemorii *fh*, quae angulo ipsius *h e f* subiicitur, hectemoria dicetur: & meridiani circumferentia *al*, quae interiicitur inter ipsum hectemorion, & horizontem, meridiana: circumferentiam



# DE ANALEMMATE. 10

ferentiam uero horarii a h, angulo h e a subie-  
ctam, horariam appellabimus: & uerticalem circū-  
ferentiam d K inter meridianum & horarium,  
uerticalem. Eadem quoque ratione descensui cir-  
cūferentiam d h, descensiuam nominabimus:  
& ipsam n f horizontis circūferentiā, horizōtalē.



Animaduertendum autem Ptolemæum angulos  
etiam ipsos, quibus hæ circūferentiæ subiiciun-  
tur, eodem nomine appellare. Vt enim h e f, he-  
ctemorii angulum appellat, cui f h, hectemoria  
C ii circūfe-

*Anguli denominatur  
ab eubhensis circūfe-  
rentiæ, ut hectemorii  
ab hectemorio eubhensis*



circunferentia subiicitur; ita & a l uocat meridia-  
ni angulum, cui subiicitur meridiana a l, quòd  
in meridiani plano fieri contingat. Similiter &  
ipsum d e K, uerticalis, & f e n, horizontis angu-  
lum nominat.

*Anguli primo vltimo  
recti, quibus desin-  
unt, ad uentus sub-*

*terminatur primi  
a polis sup quos uenit  
tur, ad positionem.*

*Maxime obseruandū*

*unde egrediuntur  
in circulis manentibus*

At in magnitudinibus semper eligimus  
acutum angulum consistentem ex alteru-  
tra parte, si non sint recti. principia autem  
acceptationum in circulis, qui mouentur, fa-  
cimus ab altero polo conuersionis, ad quā  
fit declinatio; hoc est in iis quidem, quæ  
sunt ipsius hectemorii, a termino diametri  
æquinoctialis, ante meridiem orientali, &  
post meridiem occidentali. in iis uero quæ  
horarii, a termino diametri meridiani, ar-  
ctico quidem, quando positio radii magis  
septentrionalis fuerit, quàm circulus uer-  
ticalis: meridiano autem, quando magis au-  
stralis. quod maxime obseruandum est, quo-  
niam nō eandem habet determinationem.  
postremo in iis quæ descensiui, solum a ter-  
mino gnomonis, qui est supra terram. At  
uero in circulis manentibus principia acce-  
ptionum sumimus ab altero termino, tan-  
quam



quam communi sectione uniuscuiusque,  
& superpositi plani, ad quod facit angulum  
declinatio; hoc est in iis, quæ meridiani, a  
termino lineæ meridianæ, arctico quidem,  
cum radius magis septentrionalis fuerit,  
quàm circulus uerticālis; meridiano autē,  
cum magis australis: hoc enim rursus deter-  
minare oportet. & in iis quæ circuli uerti-  
calis, a termino gnomonis solum, qui est  
supra terrā. Sed in iis, quæ horizōtis, a termi-  
no diametri æquinoctialis, orientali quidē  
ante meridiē, post meridiē uero occidētali:  
& cū radius magis boreā attingat, quàm cir-  
culus uerticālis, ut ad septentrionem; cum  
magis attingat austrum, ut ad meridiem.  
quod & ipsum diligenter animaduertendū  
est. Et generaliter positiones earum ex utra-  
que parte, quæ ad ortum, uel occasum per-  
tinent, ut quæ horarii, quæ descensui, &  
quæ uerticālis, medium cælum simpliciter  
designat. eas uero, quæ ad septentrionem,  
aut meridiem, ut quæ descēsiui, rursus quæ  
hæctemorii, quæ meridiani, & quæ horizō-  
tis, positio radii ex utraque parte circuli  
uerti-

*magis obscurū*



PTOLEMAEVS  
verticalis ostendit: & has ipsas non habentes unum, atque eundem terminum.


COMMENTARIVS.

ANTEQVAM ad modum accipiendi angulos, & circumferentias aggrediatur Ptolemæus, tradit non nulla, quæ maxime attendere oportet, primum quid accipiendum sit: deinde quod sit eius principium. Quoniam enim anguli, qui a circulis, quos diximus, constituuntur, siue rectis lineis, siue eorum planis contenti, interdum æquales, ac recti sunt, interdum inæquales: quorū alter acutus, alter obtusus: ipse, cū inæquales sunt, semper acutum angulum accipiendum esse præcipit, & circumferentiam acuto angulo subiectam. cuius quidem circumferentiæ principium in circulis mobilibus sumitur ab altero cōuersionis polo, secundum quam feruntur: & in manentibus ab altero termino communis eorum sectionis, & circulorum, qui ab ipsis declinant. atque hæc principia in uno, eodemq; puncto conueniunt delati circuli & manentis: nam ut in eadem figura, ex duobus angulis, qui continentur radio  $he$ , &  $g$  diametro æquinoctialis, hoc est  $hef$ ,  $heg$  ipsum  $hef$  acutum pro hectemorii angulo accipere oportet, & ex duabus circumferentiis hectemorii  $fh$ ,  $glh$ , ipsam  $fh$ , angulo  $hef$  subiectam. Similiter & ex iis, qui continentur hectemo-

rii



rii circuli plano, & horizontis  $l e a$ ,  $l e c$ , angu-  
lum  $l e a$ , accipimus: & ex circumferentiis meri-  
diani  $a l$ , et  $d l$ , ipsam  $a l$ , quæ angulo  $l e a$  subii-  
citur: & ita in reliquis. Erit autem idem  $f$  prin-  
cipium circumferentiæ hectemorii  $f h$ , utpote  
eius conuersionis polus, & circumferentiæ hori-



zontis  $f n$ ; cum sit terminus ipsius  $f g$ , commu-  
nis sectionis, horizontisq; & hectemorii, qui ab  
eo declinat. Eodem modo erit  $a$  commune prin-  
cipium circumferentiæ horarii  $a h$ , & meridiani  
 $a l$ :



PTOLEMAEVS

a l: itemq; d principium circumferentiæ d h descensui, & uerticulis d K. cetera, quæ hoc loco dicuntur, ex his ipsis manifesta erunt.


- A His igitur ita definitis, ueniamus ad instrumentales acceptiones in unaquaque specie positorum a nobis angulorum: ut in promptu habeamus methodum, quæ est in analemmate. & in primis trademus acceptionem anguli, qui prætermisus est ab antiquis, quem nos hectemorion uocamus: quoniam & demonstrationem ipsius necessarium utique erit adiungere ad ea, quæ ab
- \* B illis aliter demonstrata sunt. Itaque perspicuum est & quæsitos in æquinoctiis angulos, & qui in plano æquinoctialis fiunt, semper eosdē esse. hectemorios enim per totam conuersionem congruit æquinoctiali, facientiæquales inter sese peripherias, quæ in singulis horis æquinoctialibus ex quindecim gradibus constant, & angulos ipsis consequentes, qui sextas partes continent unius recti. Reliquorum autem parallelorum menstruorum causa, sit meridianus circulus a b g d: in quo horizontis diameter a b:



DE ANALEMMATE. 13

ab: atque ipsi ad rectos angulos, & secundum gnomonem gd: & punctum e centrum sphaerae solis. unius uero parallelorum menstruorum magis septentrionaliū, quā æquinoctialis, sit diameter z h t: circa quam

orientalis semicirculus in eodem plano intelligatur z k t: & ducatur ipsi z t ad rectos angulos h k, ita ut z k portio




paralleli sit supra terrā: & sumpta peripheria k l, ducatur ab l ad z t perpendicularis l m: de inde ex centro quidem m, interuallo autem m l accipiatur punctū in meridiano, quod sit x: iunganturq; e l, e m n, e x, m x, & ipsi e n ad rectos angulos ducatur e o. Dico angulum x e o angulo hectemorii quæsito

D aequalem



PTOLEMAEVS

æqualē esse, intelligatur enim semicirculus  
 z l t conuersus ad propriam positionem,  
 hoc est ad meridiani planum rectus: & ab e  
 attollatur e p perpendicularis ad idem pla-  
 num, pro æquinoctiali diametro. quoniam  
 igitur l m perpendicularis est ad meridia-  
 num; erūt  
 & l m, &  
 e p ad e n  
 perpendi-  
 culares:  
 quod sint  
 in eodem  
 plano ad  
 planum a  
 b g d re-  
 cto. et quo-  
 niam e n  
 est cōm u-  
 nis sectio circuli hectemorii, & meridiani;  
 e l uero in eadem recta linea, in qua solis ra-  
 dius: erit quæsitus angulus l e p, qui radio  
 solis, & diametro æquinoctiali continetur.  
 itaque demonstrandum est angulum x e o  
 æqualem





DE ANALEMMATE. 14

æqualem esse ipsi  $lep$ . est enim  $el$  æqualis  $ex$  &  $ml$ , ipsi  $m\hat{x}$ ; & utrique communis  $e$ . *D<sup>tt</sup> quia a cono ad spheram  
& suppositione*  
ergo & angulus  $m el$  æqualis erit angulo  
 $m ex$ . sed anguli  $m ep$ ,  $m eo$ ,  $em x$ , recti  
sunt; quoniam &  $em l$ . reliquus igitur  $lep$   
reliquo  $ex m$ , hoc est ipsi  $x eo$  est æqualis.  
quod quidem demonstrare oportebat.

COMMENTARIUS.

ACCEDIT ad instrumentalem acceptionem  
angulorum & circumferentiarum, quæ ex ipso ana-  
lemmate perficitur. Ac primum quidem anguli  
hætemorii, quem antiqui prætermiserunt, non  
solum acceptionis modum tradit, sed & eius cau-  
sam, & geometricam demonstrationem: deinde  
aliorum angulorum nudam acceptionem expli-  
cat. neque enim necesse habuit Ptolemæus, quæ  
ab antiquis iã demonstrata fuerant, rursus demon-  
strare, ne acta agere uideretur. Sed quoniam an-  
tiquorū scripta non extant, ne quid desideretur,  
curabimus nos quoad fieri poterit, ut eorum o-  
mnium demonstrationes afferamus.

Itaque perspicuum est, & quæsitos in B  
æquinoctiis angulos, &, qui in plano æqui-  
noctialis fiunt, semper eosdem esse.

QUONIAM hætemorion circa æquino-  
ctialis diametrum moueri ponitur, necesse est, ut

D ii ni



PTOLEMAEVS

in æquinoctiis, dum prosequitur solem, totus toti æquinoctiali congruat. quare & ipsius anguli erūt iidem, qui fiunt in æquinoctialis plano; & circumferentiæ eadem, quæ ex quindecim gradibus constant. At cum in aliis parallelis eorum anguli differant, docet quo pacto hectemorii angulus in his accipiendus sit. hos autem parallelas Græci *ῥητῶν*, nos menstruos appellabimus, qui præter æquinoctialem sex numero sunt, tres quidem septentrionales, tres uero australes. Sed de his inferius agetur.

Erunt &  $lm$ , &  $pe$  ad  $en$  perpendiculares, quòd sint in eodem plano, ad planum  $abgd$  recto.

**C** Quoniam enim  $lm$ ,  $pe$  ad meridianum sunt perpendiculares: & planum, quod per ipsas ducitur, ad idem meridianum rectum erit. quare ex tertia definitione undecimi sequitur lineas  $lm$   $pe$  & ad ipsam  $em$  perpendiculares esse.

**D** Est enim  $el$  æqualis  $ex$ , &  $ml$  ipsi  $mx$ . Corruptus erat hic locus in translatione, quem nos ita restituimus. Sed illud idem planius concludetur in hunc modum. Quoniā enim æquales sunt  $el$ ,  $ex$ , quòd a centro ad circumferentiā ducuntur; & ipsæ  $ml$ ,  $mx$  æquales ex positione; cōmunis autem utrique  $em$ : angulus  $mex$  angulo  $mel$  est æqualis. & angulo  $eml$  recto æqualis & ipse rectus  $emx$ . & quare & reliquus  $exm$ , reliquo  $elm$



DE ANALEMMATE. 15


elm. Sed cum æquidistant inter sese  $xm, oe$ ; 28. primi.  
itemq;  $ml, ep$ , quod anguli  $meo, mep$  etiam 6. undeci-  
recti sunt: erit angulus  $xco$  æqualis angulo  $ex$  mi.  
 $m, \& lep$  angulus ipsi  $elm$ . angulus igitur  $xco$  29. primi.  
angulo  $lep$ , est æqualis.

Consequenter autē & communes ipso-  
rum acceptiones exponemus, quæ fiunt se-  
orsum in æquinoctiali, & rursus in aliquo  
parallelorum menstruorum, qui magis se-  
ptentrionales, uel australes sint, quàm ipse  
æquinoctialis. Sit igitur meridianus circu-  
lus  $abgd$ : in quo horizontis diameter  $ab$ :  
atque ipsi ad rectos angulos, & secundum  
gnomonem  $gd$ . centrum sphæræ solis  $e$ , &  
climatis peripheria  $gz$ . ducatur autē prius  
æquinoctialis diameter  $zh$ , circa quam se-  
micirculus  $zth$  sit in plano meridiani: in-  
telligaturq; in hemisphærio ad orientem: &  
describatur sole terram illuminante in una  
conuersione huius, atque aliorum paralle-  
lorum: ducta deinde  $et$  perpendiculari ad  
 $zh$ , ita ut  $zt$  sit quarta pars supra terrā, su-  
matur  $tK$  peripheria datarū horarū: & opor-  
teat angulos, qui in hac positione sunt, acci-  
pere. ducatur lineæ perpendiculares, a pun-  
cto



PTOLEMAEVS

cto quidem K ipsa Kl ad zh: per l uero m l  
n ad ae, & x lo ad eg perpendicularis: po  
naturq; ipsi l K æquales xp, m r: & iungan  
ture K, en, eo, eps, & erc. constat igitur  
radius magis australem esse, quàm uer  
ticalis circulus, per totam conuersionem



supra terram tum in æquinoctiali, tum in  
parallelis, qui magis septentrionales sunt;  
quia inclinatio sphæræ in terra, quam inco  
limus



DE ANALEMMATE. 16

limus, uergit ad meridiem: & pro ratione mutationum, quæ positionem ipsius sphaeræ consequuntur, omnia definire oportet. itaque angulus e K l, hoc est t e K, continet angulum circuli hectemorii, qui hoc loco, ut diximus, sit idem, qui in plano æquinoctialis. angulus autem a e n continet eum, qui horarii: & g e o eum, qui descensui. rursus angulus a e z eum, qui meridiani continet: g e s eum, qui uerticallis: & g e c eum, qui horizontis.

\*

B

C

COMMENTARIUS.

HACTENVS hectemorii anguli acceptionē seorsum ab aliis exposuit, ac demonstratione roborauit: nunc aggreditur ad acceptionem angulorum omnium una: idq; primum æquinoctii tempore, postea uero cum sol & ad alios parallelos transit.

Angulus autem a e n continet eum, qui horarii: & g e o eum, qui descensui.

B


INTELLIGATUR circa diametrum z h æquinoctialis semicirculus z k t h in propria positione, hoc est ad meridianum rectus: & circa gnomonem g d intelligatur semicirculus uerticallis g q t d: & descensuius g k r d. circa diametrum uero



2. secundi  
sphaerico -  
rum Theo  
dosii.

# PTOLEMAEVS

uero a b sit horizontis semicirculus a i t b, & ho  
rarii a k q b. deinde ex polo quidem a, & inter  
uallo a n semicirculus describatur n f u. æquidi  
stabit is uerticali circulo, cum eundem, quem  
ipse polum habeat; & rectus ad meridiani planum  
transibit per lineam K l, ut sit eius, & meridiani



communis sectio n l m u. Rursus ex polo g, in  
terualloq; g o semicirculus describatur o y φ;  
qui eadē ratione ad meridianum rectus transibit  
per K l, & æquidistans erit horizonti, ut sit eius,  
&



DE ANALEMMATE. 17

& rursus meridiani communis sectio o l x  $\phi$ . at  
communis sectio descensui, & circuli n f u sit re  
cta linea K  $\theta$ : descensui, & horizontis i e: horarii  
& circuli o y  $\phi$  recta K  $\chi$ : eiusdem & uertic  
alis e q. rursus horizontis, & circuli n f u ipsa f m:  
eiusdem, æquinoctialisq; & uertic  
alis t e: uerti  
calis & o y  $\phi$  circuli y x. secet autem recta linea  
e i ipsam m f in puncto  $\downarrow$ ; secabit enim, quoniã  
utræque sunt in eodem horizontis plano, estq; pũ  
ctum i descensui inter f & a: & cadet  $\downarrow$  in linea  
K  $\theta$ . nam cum sit  $\downarrow$  in communi sectione horizon  
tis, & descensui, & rursus in sectione horizontis,  
& circuli n f u: erit in descensuo pariter, & in  
ipso n f u circulo. quare & in communi eorum  
sectione, hoc est in linea K  $\theta$ . eadem ratione cũ  
lineæ e q, x y sint in plano uertic  
alis; & q pun  
ctum horarii inter y & g; linea e q ipsam x y seca  
bit: (secet autem in  $\omega$ ) & cadet  $\omega$  in linea K  $\chi$ .  
Itaque quoniam circulus n f u uerticali æquidi  
stat, erit arcus meridiani n g inter duos circu  
los interiectus, æqualis arcui horarii K q. Sed &  
arcus a g æqualis est ipsi a q, quod uterque sit  
quarta circuli. reliquus igitur arcus a n reliquo a  
K est æqualis. & angulus a e n, cui subtenditur  
arcus a n meridiani, æqualis angulo a e K, cui ho  
rarii arcus a K subtenditur. atque is est horarii  
angulus, qui scilicet radio solis K e, & a e linea  
meridiana continetur. & cum circulus o y  $\phi$  æqui  
distet horizonti, similiter demonstrabitur arcus


10. secũdi  
sphærico -  
rum.

E g o



# PTOLEMAEVS

go meridiani æqualis arcui descensui  $gK$ : & angulus  $ge o$  æqualis angulo  $ge K$  descensui, qui ex radio solis, & gnomone constat. Præterea quoniam horarius duos circulos æquidistantes secat, horizontem, & circulum  $o y \phi$ ; erunt communes ipsorum sectiones rectæ lineæ  $a b$ ,  $K \chi$  æquidistan



tes. sed recta linea  $o \phi$  æquidistans est ipsi  $a b$ . quare &  $K \chi$  ipsi  $o \phi$ . æquidistant autem inter sese  $K l$ ,  $\omega x$ , quod sint sectiones planorum æquidistantium factæ a circulo  $o y \phi$ . ergo parallelogrâum est




DE ANALEMMATE. 18

est ipsum  $K\omega x l$ , & linea  $\omega x$  æqualis lineæ  $K l$ .  
 Quòd cum posuerimus lineam  $x p$  æqualem esse  
 ipsi  $K l$ , erunt  $\omega x$ ,  $x p$  inter se æquales: & trian-  
 guli  $p e x$  duo latera  $p x$ ,  $x e$  æqualia duobus  
 lateribus  $\omega x$ ,  $x e$  trianguli  $\omega e x$ . Suntq; angu-  
 li ad  $x$  utrique recti. ergo & basis  $e p$  æqualis 4.primi.  
 est ipsi  $\omega e$ , & angulus  $e p x$  angulo  $e \omega x$ . Sed  
 cum linea  $o \phi$  facta sit æquidistans ipsi  $a b$ , angu-  
 lus  $a e s$  æqualis erit angulo  $e p x$ . et ob eandem ra- 29.primi.  
 tionem cum æquidistant  $x y$ ,  $t e$ , sunt enim sectio-  
 nes planorum æquidistantiū a uerticali factæ, erit  
 angulus  $t e q$  æqualis ipsi  $e \omega x$ . ex quibus sequi-  
 tur angulū  $a e s$  angulo  $t e q$  æqualem esse. At uero  
 angulus  $a e g$  æqualis est ipsi  $t e g$  angulo, quia u-  
 terque rectus. ergo & reliquus  $g e s$  reliquo  $g e q$ ,  
 uerticilis scilicet angulo est æqualis: & arcus  $s g$   
 meridiani æqualis ipsi  $q g$  uerticilis, qui inter me-  
 ridianum, & horarium interiicitur. Rursus quo-  
 niam descensiuus duorum circulorum æquidistan-  
 tium, uerticilis scilicet, & circuli  $n f u$  plana fe-  
 cat, erunt & communes iporum sectiones  $g d$ ,  
 $K \theta$  æquidistantes. & cum æquidistant  $n u$ ,  $g d$ ,  
 & ipsæ  $K \theta$ ,  $n u$  æquidistabunt. Sed æquidistant  $\psi$  9.undeci  
 $m$ ,  $K l$ , planorum æquidistantium sectiones, pa-  
 rallelogrammum igitur erit  $\psi m l K$ , & linea  $\psi m$   
 lineæ  $K l$  æqualis, hoc est ipsi  $m r$ . quare triangu-  
 li  $r e m$  duo latera  $e m$ ,  $m r$  æqualia sunt duobus  
 lateribus  $e m$ ,  $m \psi$  trianguli  $\psi e m$ , anguliq; ad  $m$   
 recti. ergo &  $\psi e$  æqualis ipsi  $r e$ ; & angulus  $m r e$   
 E ii angulo



PTOLEMAEVS

angulo  $m \downarrow$  e æqualis, hoc est angulus  $g e c$  ipsi  $t e$   
i horizontis angulo : æquidistant enim  $m f$ , et se  
ctiones circularum æquidistantium factæ ab hori-  
zonte. & propterea arcus meridiani  $g e$  æqualis  
erit horizontis arcui  $t i$ , qui est inter circulum uer-  
ticalem, & ipsum descensuum, quæ omnia de-  
monstrasse oportebat.




C g e f eum, qui uerticalis.

Hæc addidimus, quæ in translatione non erant.

**A** Sit rursus a b g d meridianus cum dia-  
metris



## 19




z k ducatur t l, ita ut z l portio paralleli sit fu-  
pra terrā. sumpta autē l m peripheria data-  
rum horarum, ducatur ab m ipsa m n per-  
pen-



## PTOLEMAEVS

**B** perpendicularis ad  $z t$ , cū ipsum  $n$  positionem radii magis septentrionalē efficiat, quàm sit circulus uerticālis, quādo in linea  $h t$  fuerit: magis australem uero, quando fuerit in  $z h$ . ducatur etiam  $e n x$ , & ad ipsam perpendicularis erigatur  $e o$ : sumanturq; in meri-



diano puncta tria : punctum quidem p ex  
centro n, & interuallo n m: punctum r ex  
centro t, & interuallo t m: punctum uero s  
ex



DE ANALEMMATE. 20

ex cētro h, interualloq; h m: & ducātur r n  
c, s n y: ipsæ enim sunt per n perpendicu C  
lares ad a e, & e g. deinde sumantur in ipsis  
similiter y n f, c n q, quæ ipsi m n sint æqua  
les: & iungantur e p, e r, e s, m t, e f, & e q  
ω. Itaque continet & hic p e o angulum cir- D  
culi hectemorii; a e r eum, qui horarii; g e s E  
eum, qui descensiu: & rursus a e x eum, qui  
meridiani; g e ↓ eum, qui uerticālis; & g e  
ω eum, qui horizontis: cum ipsum t m n F  
eum, qui est in plano æquinoctialis conti-  
neat.

COMMENTARIVS.

PROSEQVITVR acceptiones angulorū,  
dum sol in aliis parallelis conuertitur. & quan-  
quam eorum tantum, qui septentrionales sunt,  
exemplum afferat, eadem tamen erit in omnibus  
ratio.

Cum ipsum n positionem radii magis se B  
ptentrionalem efficiat, quā sit circulus  
uerticālis.

Diameter enim paralleli z k fecat diametrum  
a b in puncto t, & g d gnomonem in h, ita ut h  
t ad septentrionem, z h ad meridiem pertineat.  
Ipsæ



C Ipsæ enim sunt per n perpendiculares ad  
ae, & eg.

Nam ex puncto n ductis perpendicularibus  
ny quidem ad ge; n c uero ad ae, & ad circuli  
usque circumferentiam ex utraque parte protra-  
ctis, quæ sint r n c i, s n y u, iungantur h m, h s,  
t m, t r, erit linea h m æqualis ipsi h s, & linea t m  
47 primi. ipsi t r. in rectangulo enim triangulo h m n, qua-  
dratū h m æquale est duobus quadratis h n, n m :  
quorum h n item duobus h y, y n est æquale.


17. sexti. Quòd cum linea n m sit medio loco proportiona-  
lis inter s n, n u: erit ipsius quadratum æquale  
rectangulo s n u. sed rectangulum s n u quadra-  
to s n est æquale, & duobus insuper rectangulis,  
quæ s n y continentur, ut mox ostendemus. qua-  
dratum igitur h m æquale erit tribus quadratis  
4. secundi h y, y n, s n, & duobus rectangulis s n y. At ue-  
ro quadratum h s est æquale duobus quadratis h  
y, y s: quorum y s æquale item est duobus s n, n  
y, & duobus s n y rectangulis. Sed iisdem æqua-  
le erat quadratum h m. ergo quadratum h m qua-  
drato h s est æquale, & idcirco linea h m æqua-  
lis ipsi h s. Rursus quoniam in triangulo t m n  
quadratum t m æquale est duobus quadratis t n,  
n m: quorum quadratorum ipsum t n similiter  
est æquale duobus n c, c t: quadratum uero n m,  
ut ostendimus, æquale est quadrato s n, & duo-  
bus rectangulis s n y: erit quadratum t m æquale  
tribus



# DE ANALEMMATE. 21

tribus quadratis  $nc$ ,  $ct$ ,  $sn$ , & duobus rectāgu-  
lis  $sn y$ . Sed cum quadratū  $tr$  æquale sit duobus  
quadratis  $tc$ ,  $cr$ ; quorū  $c$  est æquale duobus  $c$   
 $n$ ,  $nr$ , & duobus  $cnr$  rectāgulis: erit quadratū  
 $tr$  æquale tribus quadratis  $tc$ ,  $cn$ ,  $nr$ . & duobus  
rectāgulis  $cnr$ . est autē rectangulū  $inr$  æquale re-

35. tertii.



ctāgulo  $fnu$ : rectāguloq;  $inr$  æquale est quadra-  
tū  $nr$ , & duo rectangula  $cnr$ : & rectāgulo  $sn u$  æ-  
quale  $sn$  quadratū, ac duo rectāgula  $sn y$ . quare  
quadratum  $nr$ , & duo rectangula  $cnr$  æqualia  
F sunt




# PTOLEMAEVS

funt quadrato  $sn$ , & duobus rectangulis  $sn y$ .  
 quadratum igitur  $tr$  æquale erit tribus quadratis  
 $tc$ ,  $cn$ ,  $sn$ , & duobus item rectangulis  $sn y$ .  
 quibus quidem æquale erat & quadratum  $tm$ .  
 ergo  $tm$  quadratum quadrato  $tr$  est æquale, &  
 linea  $tm$  æqualis lineæ  $tr$ . Ex quibus constat, si  
 in meridiano sumantur puncta  $rs$ , ita ut linea  $tr$   
 sit æqualis  $tm$ , &  $h$  ipsi  $hm$ ; iunctæq;  $rn$ ,  $sn$  pro  
 ducantur; lineam  $rn$  ad  $ae$ , &  $sn$  ad  $eg$  perpen  
 diculares esse. quod quidē demonstrasse oportebat.  
 Illud uero proposito hoc theoremate ostēdemus:

Si recta linea secetur in partes æquales,  
 & inæquales, rectangulum, quod inæqua  
 libus partibus continetur, æquale est qua  
 drato minoris partis, & rectangulo conten  
 to bis minori parte, & ea, quæ inter ipsas  
 sectiones interiicitur.

Secetur  
 recta li  
 nea  $ab$   
 in partes  
 æquales  
 in pun  
 cto  $c$ , &  
 in partes  
 inæqua  
 les, in  $d$ . Dico rectangulū  $adb$  æquale esse quadra  
 to  $db$ ,





to d b, & rectāgulo, quod bis b d c cōtinetur. Sece-  
 tur enim rursus a c in e, ita ut e c æqualis sit ipsi  
 c d. erit a e æqualis d b, & b e ipsi a d. fiat ex d b  
 quadratum d b f g: protrahaturq; f g, & per pun-  
 ctā e c ducantur æquidistantes ipsis b f, d g: quæ  
 sint c h, e k. rectangulum igitur e f æquale est ei,  
 quod inæqualibus partibus continetur; uidelicet  
 ipsi a d b: & rectangulum e g æquale ei, quod bis  
 continetur c d b, cum e c, c d sint æquales. quare  
 rectangulum a d b æquale est quadrato d b, & ei,  
 quod bis b d c continetur rectāgulo, quod osten-  
 dendum fuerat.

Itaque continet & hic p e o angulum cir- **D**  
 culi hectemorii.

Hoc enim superius demonstrauit.

a e r eum, qui horarii: g e f eum, qui de- **E**  
 scensiu.

ex iis, quæ nos proxime demonstraui.


Cum ipsum t m n eum, qui est in plano **F**  
 æquinoctialis contineat.

Sit punctum n in quo horarius circulus æquino  
 F ii ctialem



# PTOLEMAEVS

ctialem secat: & intelligatur æquinoctialis  $\theta n \phi$  ad  
meridiani planū rectus. a puncto autē  $n$  ad lineā  
 $\theta \phi$  ducatur perpēdicularis  $n \lambda$ : & ab  $e$  perpēdicu-  
laris ducatur in plano æquinoctialis  $e \chi$ : & iunga-  
tur  $e n$ . erit ipsa  $e n$  æquinoctialis, horarii q; cōmu-




nis sectio: &  $e \chi$  æquinoctialis diameter. angulus  
autem  $n e \chi$  erit is, qui in æquinoctialis plano con-  
stituitur. Itaque quoniam horarius circulus æqui-  
distantia plana secat, uidelicet planum æquino-  
ctialis



DE ANALEMMATE. 23

etialis  $\theta n \phi$ , & paralleli  $z m k$ : cōmunes ipforum  
 sectiones  $n e$ ,  $m t$ , æquidistantes erunt. Sed æqui-  
 distant inter sese  $n \lambda$ ,  $m n$ , ad idem planum perpen-  
 diculares. angulus igitur  $t m n$  æqualis est angu-  
 lo  $e n \lambda$ , hoc est ipsi  $n e \chi$ , qui fit in æquinoctialis  
 plano, quod demonstrasse oportebat.

10. undeci  
 mi.



Instrumentales igitur acceptiones hoc  
 modo fiunt, sumpta simili consequentia in  
 omnibus positionibus. In expositione au-  
 tem quantitatum, quæ sunt in uno quoque  
 climate



## PTOLEMAEVS

climate, & signo, & gradu, satis erit in ipsis  
 peripheriis, quæ angulis subiiciuntur, magni-  
 tudines dimetiri, ut promptas in numeris  
 \* habeamus: neque oportebit descriptioni-  
 bus determinatis, & semel tantum cogita-  
 tione percursis, inuestigare ex analemmate  
 quæsitos angulos rectarum linearum fere  
 ubique confusarum: sed in quanque op-  
 portunitatem, una aliqua quarta circuli par-  
 te in portiones nonaginta æquales diuisa,  
 inscribemus, & circumscribemus concen-  
 \* tricum cum dato circulo: accipientesq; a  
 diuiso interualla, quæ ipsorum graduum  
 numerum contineant, transferemus ad æ-  
 qualē sibi quartā; & per deprehensos termi-  
 nos, & per commune centrum circulorum  
 producentes rectas lineas, inueniemus an-  
 gulos, & peripherias in datis circulis ma-  
 ioribus, uel minoribus.

## COMMENTARIVS.


POSTQVAM docuit Ptolemæus, quo pa-  
 cto angulorum, & circumferentiarum ipsis subie-  
 ctarum quantitates ex analemmate accipiantur,  
 quas



# DE ANALEMMATE.

24

quas instrumentales acceptiones appellat : transit ad earum expositiones : dicitq; in iis quidē, quæ ad unumquodque clima, signum, & gradum pertinent, satis esse circumferentias ipsas dimetiri, ita ut numeris expressæ in promptu habeantur : neque oportere quæsitos angulos ex analemmate per maximam linearum confusionem perscrutari. cū enim eas ita exposuerimus, fieri posse, ut iidē anguli, & circumferētiæ eadem in aliis, atque aliis circulis tum maioribus tum minoribus facile inueniantur. Sit enim circulus a b c d, cuius centrum e, du



ctisq; diametris a c, b d sese ad angulos rectos secantibus, eius quarta a b in partes nonaginta æqualiter diuidatur : & ex eodem centro describantur alii duo circuli, f g h k quidem ipso a b c d maior, l m n o uero minor, ita ut diametri productæ secent maiorem circulum in punctis f g h k, & minorem in ipsis l m n o. Deinde ex di

uisa



uisa circuli quarta sumatur portio aliqua a p cōti-  
nens numerū graduum datæ cuiuspiam circunfe-  
rētiæ:trāsferaturq; ad æqualē sibi quartā c d,quæ  
sit c q,&per e centrū, & per q ducatur recta linea  
e q r,secans circulum f g h K in r, & ipsum l m n  
o in s. Dico circunferentiam h r tot partes sui  
circuli f g h k continere, quot ipsa c q conti-  
net circuli a b c d: et similiter totidem continere  
n s circuli l m n o. quam enim proportionem

ad ipsam  $l m n o$ . quare  $h r$  ad circumferentiam  
sui circuli  $f g h K$ , &  $n s$  ad circumferentiam  $l m$   
 $n o$  eandem proportionem habet, quam  $e q$  ad  
ipsam  $a b c d$  circumferentiam. ex quibus apparet  
uerū esse illud, quod demonstrandū proponebatur.


Talis autem acceptio extabit utique &  
per



per lineas exquisitissime iis, qui hoc perfe-  
qui uolent. Sed facilius acquireretur & per  
ipsum analemma. & quanquam non æque  
certa sit, atque ea, quæ per lineares demon-  
strationes, tamen pertinet usque ad com-  
prehensionem sensibus factam, ad quam fi-  
nis, ususq; propositæ tractationis refertur.  
quo autem modo uterque processus fa-  
cillime

accipia-  
tur, ex  
parte sū-  
matim  
ostende-  
demus,  
præmis-  
sa consi-  
deratio-  
ne, quæ  
fit per  
nume-

ros in hunc modum. Sit meridianus circulus a b g d, circa centrum e, in quo diametri ad rectos angulos inuicem, communis qui-






PTOLEMAEVS

dem sectionis ipsius. & horizontis a b, gno-  
monis autem g d : sitq; data poli altitudo,  
quam cōtineat peripheria a z : & ducatur a-  
xis z e h, & æquinoctialis diameter K e t.  
C sumatur autem data peripheria z l; & ab l  
ducantur perpendiculares, l m quidem ad  
e z, & l  
n ad e k.

Simili-  
ter & ab  
n ad a e  
perpen-  
dicularis ducatur x n  
o, & ad g  
e ipsa p n  
r. Quo-  
niam igitur

E tur data est peripheria a z, hoc est g K, da-  
tus erit & angulus p e n : rectus autem qui  
ad p : data est ergo & ipsius e n subtensæ pro-  
portio ad utranque earum, quæ sunt circa  
rectum angulum, hoc est ad e p, p n : & ad  
æquales





æquales ipsis  $nx, xc$ . Rursus quoniam data est  $lz$  peripheria, quarta autem pars est  $Kz$ ; & reliqua  $Kl$  data erit. Subtenditur autem duplæ  $lz$  peripheriæ, dupla ipsius  $lm$  rectæ: & duplæ  $lK$  peripheriæ dupla rectæ  $ln$ . data igitur erit & proportio utriusque ipsarum  $lm, ln$  ad diametrum meridiani. quare & proportio ipsius  $e n$ , quæ est æqualis  $lm$ : & proportio ipsorum  $ep, pn$  laterum quadranguli. Itaque sumantur ipsi  $ln$  æquales  $ps, xc$ : & ducantur  $eo, er, esy, ecf$ . ergo  $zl$  peripheria æqualis ei, quæ circuli hectemorii, & adhuc ei, quæ in plano æquinoctialis per se data est. Et quoniam ipsius  $exo$  rectanguli trianguli data sunt  $ex, xo$ , &  $eo$  subtendens dabitur: angulusq;  $cox$ , & reliquus  $oex$ . quare &  $ao$  peripheria continens eum, qui est circuli horarii. Similiter quoniam & ipsius  $ep r$  rectanguli data sunt  $e p, pr$ , &  $er$  subtendens dabitur, & angulus  $erp$ . ergo & reliquus  $per$ , & una cum ipso peripheria  $gr$ , æqualis ei, quæ est circuli descensui. Rursus  $aK$  peripheria fa-

F

G

\*

G ii ciens



PTOLEMAEVS

H ciēs eū, qui meridiani per se data est. Quoniam autem ipsius  $eps$  rectanguli data est  $ep$ , &  $ps$ , dabitur &  $es$  subtensa, angulusq;  $pse$ , hoc est  $s ex$ , & reliquus  $sep$ , &  $gy$  peripheria æqualis ei, quæ circuli uerticis. Eadem ratione quoniam & ipsius  $exc$  rectanguli data est  $ex$ , &  $xc$ , data erit &  $ec$  subtensa, & angulus  $ecx$ , hoc est  $g ec$ , &  $gf$  peripheria æqualis ei, quæ horizontis.

COMMENTARIVS.

EST etiam alius acceptionis modus per lineas, multo certior, exquisitiorq; : sed qui per analemma fit, multo facilior est, atque ab illo paulum differens, ut uix sensu percipiatur. Quo autem pacto uterque horum in prōptu nobis sit, deinceps ostendit.

B Præmissa consideratione, quæ fit per numeros, in hunc modum.

Vide ne potius legendum sit, per lineas, nisi forte per numeros dixit, quoniam numeris utitur ad inuestigandas linearum quantitates, id quod & alibi sæpius, & in magna compositione, tum Archimedis, tum aliorum antiquorum exemplo facere consuevit. Ostendit autem illud primum, sole  
in



in æquinoctiali circulo existente.

Sumatur autem data peripheria  $z l$ , & ab  $C$   
 $l$  ducantur perpendiculares,  $l m$  ad  $e z$ , &  $l n$   
 ad  $e K$ .

Vt intelligatur scilicet  $z K$  quarta æquinoctia-  
 lis, quæ est supra terram.

Quoniam igitur data est peripheria  $a z$ .  $D$

Est enim circumferentia  $z K$  æqualis ipsi  $a g$ ,  
 cum sit quarta eiusdem circuli. quare sublata com-  
 muni  $a K$ , reliqua  $g K$ , reliquæ  $a z$  æqualis erit.

Datus erit & angulus  $p e n$ ; rectus autē  $E$   
 ad  $p$ .

Ponatur exempli gratia circumferentiam  $z l$   
 duarum horarum esse, hoc est partium 30, qua-  
 lium tota circumferentia est 360: & poli altitudo,  
 quæ est Romæ partium 42 erit angulus  $p e n$ , ad  
 centrum quidem constitutus 42 partium; ad cir-  
 cunferentiam uero 84, descripto nempe circulo cir-  
 ca triangulū  $p e n$ : & angulus  $e p n$  rectus 180. reli-  
 quus igitur  $e n p$  96. ut autē rectarū linearum, quæ  
 angulis subiiciuntur, quātitates inueniamus, uti-  
 mur non integris arcubus, sed dimidiatis, & simili-  
 ter dimidiatis chordis, quos sinus appellāt. Itaque  
 ex iis tabulis, in quibus circuli semidiameter po-  
 nitur 100000 partium, erit  $e n$  sinus totus, hoc  
 est 100000:  $e p$  74314, &  $p n$  66913.

Rursus quoniam data est  $l z$  peripheria,  $F$   
 Quoniam



Quoniam arcus  $l z$  ponitur 30 partium, erit  $l k$  reliquus, qui circuli quartam perficit, hoc est 60; recta q;  $l m$  50000. &  $l n$  86602 earum partium, quarum meridiani diameter est 100000. quod cum  $n e$  æqualis ipsi  $l m$  sit earundem 50000: erit  $e p$  37157, &  $p n$  33456.

**G** Et quoniam ipsius ex o rectanguli trianguli datae sunt  $e x$ ,  $x o$ , &  $e o$  subtendens dabitur.

**B** Vereor, ne hic locus corruptus sit: neque enim ex iis, quæ dicta sunt, datur  $x o$ : immo uero ipsa  $e o$  meridiani diameter prius data est. neque si daretur  $x o$ , alia ulla indigeremus, quoniam circumferentia horarii a o ex ipsa tanquam ex sinu dari posset. nunc autem cum datae sint  $x e$ ,  $e o$ , & angulus  $e o x$ , reliquusq;  $o e x$ , & a o circumferentia dabitur. uel fortasse expeditius ex sola  $x e$  data, statim datus erit & arcus  $g o$ , cuius sinui ipsa  $x e$  est æqualis, duplo enim arcus  $g e$  subtenditur chorda ipsius  $x e$  dupla, quare & arcus a o reliquus ad 90 dabitur, qui horarii circuli angulum continet. cum igitur  $x e$  sit 33456, erit arcus  $g o$  partium 19, m. 33: & a o partium 70, m. 27. Rursus quoniam data est  $p e$  æqualis sinui arcus  $a r$ , datus erit & ipse, &  $g r$  reliquus ad 90, qui subiicitur angulo descensui. cum enim  $p e$  sit 37157, arcus  $a r$  ex partibus 21, m. 49, constabit; &  $g r$  ex partibus 69, m. 11.

Quoniam



Quoniam autem ipsius  $eps$  rectangu  $H$   
li data est  $ep$ , &  $ps$ , dabitur &  $s$  subtenfa.

Cum  $ep$ ,  $ps$  datae sint, dabuntur & earum quadrata; & quadratum ex utrisque constans, cuius latus erit ipsa  $s$ . Itaque cum trianguli rectanguli  $eps$  latera data sint, & anguli dabuntur  $pes$ ,  $sep$ . quare &  $gy$  circumferentia uerticulis. eodem modo & trianguli rectanguli  $exc$  datis lateribus, & angulus  $ecx$ , hoc est  $gec$  dabitur: & propterea  $gf$  circumferentia horizontis. Erat autem  $ep$  37157, &  $ps$  aequalis In 86602. quarum quadrata 1380642649 : 7499906404, inter sese iuncta faciunt 8880549053. eius uero quadrati latus propinquum est 94236, ipsa scilicet  $s$ . reducatur ergo latus  $s$ , quod opponitur angulo recto ad sinum totum, hoc est ad 100000, & fiat ut 94236 ad 100000, ita 86602 ad alium numerum, qui est 91899, & totidem partium erit ipsa  $sp$ , cui sinui respondet arcus uerticulis  $gy$ , partium 66, m. 47. Rursus trianguli  $exc$  erat  $ex$  33456, &  $xc$  86602 quadrata autem earum 1119303936, 7499906404 inter sese composita faciunt 8619210340; cuius quadrati latus propinquum est 92839. fiat igitur, ut 92839 ad 100000, ita 33456 ad alium, hoc est ad 36036: erit  $xe$  36036, cui respondet arcus  $gf$  partium 21, m. 7. atque is est, qui horizontis angulo subiicitur.

Et aliorum menstruorum gratia, sit  $abgd$   $A$   
meridianus




H meridianus cum diametris ad rectos inui-  
 cem angulos, & cum axe  $ez$ : ducaturq; u-  
 nius rursus menſtruorum parallelorū, qui  
 magis australes ſint, quā æquinoctialis,  
 diameter  $htK$ : circa quam ad oriētem ſe-  
 micirculus  $hlK$  deſcribatur: & uſque ad  
 ipſum protrahatur axis  $ezl$ , ſecās diametrū  
 $htK$  bifariam in puncto  $t$ , & ſemicircu-  
 lum  $hK$  in  $l$ . ducatur autem &  $mn$  per-  
 pendicularis ad  $ht$ , diſtinguens  $hn$ , &  
 portionem ſemicirculi ſupra terram ab ea,  
 quæ eſt ſub terra. & ſumpta  $nx$  periphe-  
 ria datarum horarum, ducatur ab  $x$  ad  $hm$   
 perpendicularis  $xo$ : & per  $o$  ducātur per-  
 pendiculares,  $por$  quidem ad  $ae$ ,  $soc$   
 B uero ad  $ge$ . Quoniam igitur data eſt  $hzK$   
 C meridiani peripheria: reliquo autem ſemi-  
 \* circuli ſubtenditur dupla ipſius et rectæ;  
 data erit proportio  $htK$ , & ipſius et ad  
 D diametrum meridiani. Similiter quoniam  
 data eſt  $az$  peripheria altitudinis poli, da-  
 tus erit &  $etm$  rectanguli trianguli angu-  
 lus  $met$ . quare proportio  $et$  rectæ ad  
 utranque ipſarum  $em$ ,  $mt$  data erit, &  
 adhuc



adhuc proportio h K diametri ad unā quan-  
que ipsarū. Sed dupla rectæ m t subtenditur  
duplæ ipsius l n peripheriæ. quare & l n peri-  
pheria data erit; & reliqua, quæ perficit quar-  
tā circuli partē n x h. data est autē & n x. ergo  
data erit & l x, & x h. subtēditurq; duplæ qui

E




dē h x peripheriæ, dupla ipsius x o rectæ: du-  
plæ uero peripheriæ l h dupla rectæ h t: & du-  
plæ l x peripheriæ dupla ipsius o t. quare da-  
ta erit ipsarū x o, o t proportio ad diametrū  
H h k:

F



PTOLEMAEVS

**G** h K: & idcirco ad eam, quæ meridiani. præ  
**H** tera quoniam ipsius t m data est propor-  
 tio, data erit & proportio ipsius m o. est  
 autem ut em ad m o, ita t m ad m p,  
 & et ad o p: æquiangula enim sunt trian-  
 gula e t m, o p m. data ergo erit & ipsarum



$m p, o p$ , proportio ad diametrum meridia  
ni. quare & proportio  $e s$ , & totius  $e m p$ ,  
hoc est ipsius  $o s$ . Itaque his demonstratis  
sumatur



sumatur ex centro o, & interuallo o x pun-  
 ctum in meridiano, quod sit y: & rursus ipsi  
 o x sumptis æqualibus p q, s f, iungan-  
 tur e y, e x, e c, x m, e o, e f, & e q. quo K  
 niam igitur in præcedentibus demonstra-  
 tum est angulum e o y rectum esse: & data  
 est e y subtenfa, quæ est ex centro meridia-  
 ni: & o y æqualis ipsi o x, dabitur & angulus  
 e y o continens eum, qui circuli hec temo-  
 rii. Similiter quoniam & rectanguli trian- L  
 guli x m o data est x o, & o m: data erit  
 & m x subtenfa, & angulus m x o faciens  
 eum qui in plano æquinoctialis. trianguli \*  
 autem rectanguli e p r data sunt e p, p r: M  
 dabitur ergo & e r subtenfa; angulusq; p  
 e r; & ipsa a r horarii peripheria. Sed & re-  
 ctanguli e s c data sunt e s, s c: quare &  
 subtenfa e c data, & angulus e s c una  
 cum g c descensui peripheria. Rursus cū N  
 ipsius e o p rectanguli data sint o p, p e:  
 data erit & e o subtenfa, & angulus o e p  
 faciens meridiani peripheriam. Rectanguli  
 uero s f e cum data sint e s, s f; dabuntur  
 & e f subtenfa, angulusq; s e f, & g ↓ peri-  
H ii pheria



# PTOLEMAEVS

pheria uerticalis. Postremo quoniā rectan-  
guli epq datae sunt ep, pq: data erit &  
eq subtensa, & adhuc angulus eqp, hoc  
est qeg, & gω peripheria horizontis.

## COMMENTARIVS.

TRANSIT ad acceptiones lineares sole ad  
alios parallelos accedente: & exemplo utitur  
paralleli australis ad sinistras nostri partes uergen-  
tis, contra, quā in superioribus, dum instru-  
mentales acceptiones docebat: ubi parallelum se-  
ptentrionalem, & ad dexteris partes sibi proponit.  
quod quidem maximo artificio factum esse ar-  
bitramur: cum enim sex paralleli sint prāter æ-  
quinoctialem, qui per initia signorum permeant,  
tres quidem septentrionales, tres uero australes:  
ipse tres tantum in analēmate describit. quorum  
unusquisque duorum sibi ipsis oppositorum in-  
star est. nam parallelus, qui per cancrum ducitur,  
& dexteris tenet partes, translato analemate in  
oppositum situm ad sinistras partes transfertur:  
estq; instar eius, qui ducitur per Capricornum: &  
portio huius supra terram eadem est, quæ portio il-  
lius sub terra. Eodem modo qui per Geminos, &  
Leonē ad eum, qui per Sagittarium, & Aquarium  
transit: & qui per Taurum, & Virginem ad eum,  
qui per Scorpionem, & Pisces. Illud uero ita con-  
ungere quanquam Ptolemæus longo sermone  
infra



infra ostenderit, uoluit tamen prius & exemplis declarare.

Quoniam igitur data est  $h z K$  meridia B  
ni periphēria

Hunc locum nos ita restituimus, nam in translatione mendose (ut opinor) legebatur.  $z l$  meridiani periphēria. data est autem  $h z K$ , quod data sit eius paralleli distantia ab æquinōctiali, ut si ponamus  $h t K$  diametrum paralleli, qui per Capricornum ducitur; ipsius distantia hoc tempore est partium 23 m. 30, quæ tempore Ptolemæi erat partium 23 m. 51. quare circumferentiā  $h z K$  colligemus esse partium 133.

Reliquo autem semicirculi subtenditur C  
dupla ipsius  $e t$  rectæ

Est enim  $e t$  æqualis sinui dictæ paralleli distantie, hoc est 39874 earum partium, quarum semidiameter meridiani continet 100000: &  $h t$  sinus dimidii arcus  $h z K$ , earundem 91706.

Similiter quoniam data est  $a z$  periphēria D  
altitudinis poli.

Sit  $a z$  poli altitudo, quæ Romæ constat ex partibus 42. erit trianguli rectanguli  $e t m$  angulus  $m e t$  partium 84: &  $e m t$  96. quare  $e t$  ad  $e m$  eandem proportionem habebit, quam 74314 ad 100000: & ad  $m t$  eandem, quam 74314 ad 66913. fiat ut 91706 ad 100000 ita 39874 ad alium numerum



# PTOLEMAEVS

numerum, erit  $et$  43480 earum partium, quarum semidiameter  $ht$  est 100000. Rursus ut 74314 ad 100000, ita fiat 43480 ad alium numerum: & ut 74314 ad 66913, ita 43480 ad alium: ipsa  $em$  erit 58508 earundem partium: &  $mt$  39149. Sed  $mt$  est æqualis sinui arcus  $ln$ . ergo  $ln$  partes 23 m. 3 continebit: & reliquus  $n$  x h partes 66 m. 57 earum, quarum semicirculus  $hlk$  est 180.

**E** Data est autem &  $n$  x.

Sit  $n$  x circumferentia duarum horarum, hoc est partium 22 m. 19. nam cum arcus diurnus, sole principium Capricorni tenente, sit partium 133, m. 54: si diuidatur in duodecim horas more antiquorum, quæ horæ temporales, siue inæquales dicuntur: habebit unaquæque partes 11 m. 9, sec. 30. quare arcus  $lx$  erit partiū 45 m. 22, cuius sinus æqualis ipsi  $to$  71161: & arcus  $x$  h partiū 44 m. 38, cuius sinus æqualis  $ox$ , 70256.

**F** Et duplæ  $lx$  peripheriæ dupla ipsius  $ot$ .  
Hæc addidimus, quæ non erant in translatione, atque alia non nulla emendauimus.

**G** Et idcirco ad eam, quæ meridiani.


Ex iis, quæ dicta sunt, data est proportio ipsarum  $xo$ ,  $ot$  ad  $ht$  semidiametrum. quare & ad semidiametrum meridiani, ad quam ipsa  $ht$  est, ut 91706 ad 100000. Itaque fiat, ut 100000 ad 91706, ita 70256 ad alium numerum: & ita 71161 ad alium. erit  $xo$  64428; &  $ot$  65258. Rursus



# DE ANALEMMATE.

32

fus quoniam ipsarum et, em, m t, inter sese pro-  
portio data est, & proportio et ad semidime-  
trum meridiani. fiat ut 74314 ad 39874, ita 100000  
ad alium: itemq; 66913 ad alium. Colligemus e  
m esse 53656: & m t 35902 earum partium, qua-  
rum & meridiani semidiameter est 100000. & ipsa  
et 39874.



Præterea quoniam ipsius t m data est G  
proportio, data erit & proportio ipsius m o.  
Inuenimus primum t o esse 65258: dindet m  
35902



35902. relinquitur ergo, ut  $m o$  sit 29356. trianguli autem  $e t m$  angulus  $t m e$  æqualis est angulo  $p m o$  ipsius trianguli  $o p m$ : & angulus ad  $t$  rectus æqualis recto ad  $p$ . reliquus igitur  $m e t$  reliquo  $m o p$  æqualis erit. quare ut  $e m$  ad  $m o$ , ita est  $t m$  ad  $m p$ , &  $e t$  ad  $o p$ . Quòd cū data sint  $e m$ ,  $m o$ ,  $t m$ ,  $e t$ , dabuntur &  $m p$ ,  $o p$ : & tota  $e m p$ . ut enim 53656 ad 29356, ita fiat 35902 ad alium: & 39874 item ad alium. erit  $m p$  19642,  $o p$ , hoc est  $e s$  21816: &  $e p$ , hoc est  $s o$  73298.

K Quoniam igitur in præcedentibus demonstratum est angulum  $e o y$  rectum esse.

Quo loco anguli hectemorii demonstrationem attulit. cum autem trianguli  $y e o$  angulus  $e o y$  rectus sit, denturq;  $e y$  semidiameter meridiani, quæ est 100000, &  $o y$  æqualis ipsi  $o x$  64428: erit angulus  $x e o$  partium 40 m. 7: & reliquus  $e y o$ , qui est hectemorii angulus, partium 49 m. 53.

L Similiter quoniam & rectanguli trianguli  $x m o$  data est  $x o$ , &  $o m$ : data erit &  $m x$  subtenfa.

Erat enim  $x o$  64428, &  $o m$  29356. quarum quadrata 4150967184, 861774736 inter sese iuncta faciunt 5012741920, & eius quadrati latus 70801 est ipsa  $m x$ . Si igitur fiat ut 70801 ad 100000, ita 29356 ad alium numerum; erit  $m o$  41465 earum partium, quarum semidiameter circuli circa  
trian-



DE ANALEMMATE. 33

triangulum  $x m o$ , descripti continet 100000. & idcirco angulus  $m x o$  in plano æquinoctialis est partium 24 m. 30.

Trianguli autem rectanguli  $e p r$  datæ sunt  $e p$ ,  $p r$ . dabitur ergo &  $e r$  subtenfa. M

Et hic locus superiori similis est, quem etiam corruptum fuisse arbitror. non enim  $e p$ ,  $p r$ , sed ipsæ  $p e$ ,  $e r$  datæ sunt, ex quibus dabitur angulus  $p r e$ , reliquusq;  $p e r$ , & ipsa  $a r$  horarii circumferentia: uel potius ex sola  $p e$  data, & circumferentia  $g r$ , & reliqua  $a r$  dabitur. erat autem  $p e$  73298. quare  $g r$  erit partium 47 m. 8: &  $a r$  partium 42 m. 52. similiter quoniam datur  $e s$ , quæ est 21816, erit  $a c$  circumferentia partium 12 m. 36. & reliqua  $g c$  descensui partium 77 m. 24.

Rursus cum ipsius  $e o p$  rectanguli datæ sint  $o p$ ,  $p e$  N

Erat  $o p$  21816, cuius quadratum 475937856: &  $p e$  73298, cuius quadratum 5372596804. ex his autem quadratis compositum quadratum 5848534660: & eius latus 76475. fiat ut 76475 ad 100000, ita 21816 ad alium. erit  $o p$  28541; & angulus  $o e p$  partium 16 m. 35, cui meridiani circumferentia subiicitur. Eodem modo procedemus in rectangulis triangulis  $e s f$ ,  $e p q$ . nā cū dētur latera, quæ sunt circa rectum angulum, & quæ ipsi subtenduntur: & reliqui triangulorum anguli dati erunt. est enim  $e s$  21816, cuius quadra-

I tum



# PTOLEMAEVS

tum 475937856: & sf æqualis x o 64428, cuius quadratum 4150967184. atque ex his coniunctis fit 4626905040, cuius quadrati latus, ipsa scilicet ef est 68021. ut igitur 69021 ad 100000, ita fiat 64428 ad alium. erit sf 94717: & ideo angulus sef partium 71 m. 18, cui subiicitur g ↓ uerticalis circumferentia. At in triangulo epqla tus ep erat 73298, cuius quadratū 5372596804: & pq 64428, cuius quadratum 4150967184. ex his uero quadratis inter sese iunctis fit 9523563988, cuius latus, ipsa uidelicet eq 97588. Itaque ut 97588 ad 100000, ita fiat 73298 ad aliū. erit pe 75109: & angulus p q e, hoc est q e g, cui subiicitur g ω horizontis circumferentia partiū 48 m. 41.

**A** Quæ quidem igitur per lineas fiunt acceptiones angulorum, & subtensarum ipsis peripheriarum sic utique nobis in pròptu erunt: eas autem, quas ex analemmate ipso perscrutamur, facillime ex unaquaque positionum comprehendemus, hoc modo. Demonstratum est superius, eorum, quæ in analemmate describuntur, alia quidem semper eadem manere, alia autem uariari. ex iis igitur, quæ eadem manent, contenti erimus meridiano circulo, & diametro aequi-

*Lineis analemmatis*



æquinoctialis, aliorumq; menstruorum parallelorum, una cum circumscriptis ipsorum semicirculis. tropicorum tamen diametrum, & menstrui illius, qui est post æquinoctialem, ordinabimus, ut ad eundem polum: eam uero, quæ est menstrui post tropicos, ut ad polum oppositum: nam si prope tropicos locaretur, semicircularum circa ipsas circumscriptorum notas facile confunderet. Quapropter ad descriptiones utemur plano, quod tympani formam habeat; ideo ut conuerso tympano, parallelorum menstruorum diametri, quas diximus cum suis semicirculis & ad positiones eorum, quæ opponuntur aptari possint. At uero ex iis, quæ in unoquoque climate uariantur, rursus contenti erimus duabus tantum diametris; ea scilicet, quæ communis sectio est meridiani, & horizontis, & ea, quæ est secundum gnomonem: utemurq; lata quadam, & ualde subtili norma, non habente ea, quæ circa rectum angulum sunt, latera minora, quàm quæ ex centro meridiani: ut & alia puncta, & perpendiculares

I ii lineæ

B

\*



lineæ facile sumantur; altero quidem eorū,  
 quæ circa rectum angulum, aptato lineæ,  
 ad quam sunt perpendiculares; altero ad-  
 ducto ad punctum, per quod ipsæ perpen-  
 diculares transeunt. & generatim eas, quæ  
 in meridiano peripherias per solum circi-  
 nū, & per latam illam normam accipiemus,  
 nusquā describētes alterā rectā prædictarū,  
 sed nudam descriptionem seruantes, ut faci-  
 le accipiantur, quæ post prima illa, quem-  
 admodū diximus, consequuntur. Sit enim  
 \* demōstrationis causa, planum tympani for-  
 ma circa diametrum  $ab$ , & centrum  $g$ :  
 atque ipsius  $ag$  tertia parte ad  $a$  sumpta,  
 ut in  $d$ ; ex centro quidem  $g$ , interuallo au-  
 tem  $gd$  describatur, ut in analemmate,  
 circulus meridianus  $de$ , ita ut  $dge$  in-  
 C telligatur æquinoctialis diameter: dein-  
 de & ipsius  $gd$  rursus tertia parte ad  $g$   
 sumpta, ut in  $z$ , ex centro  $z$ , & interuallo  
 $gd$  describatur circuli æqualis meridiano  
 quarta pars  $htK$ , bifariam secta à linea  $a$   
 $g$  in  $t$ , & in partes nonaginta æquales ac-  
 \* curate diuidatur. nihil autem attinet & in  
 aliis







tias partium altitudinis poli, quæ sunt in unoquoque climate, adscribemus æquales & in reliquis tribus quartis, incipientes quidem a punctis l m n x, educentesq; ut ad dextram semicirculorum ad orientem, qui semper ad nos descripti esse intelliguntur.

E Itaque continet altitudo poli, ubi maxima dies, & nox est 13 horarum; partes proximæ sexdecim, tertiam, & decimam.

16 27 Vbi horarum 13 & dimidiæ; partes 23, dimidiam, & tertiam.

23 51 Vbi horarum 14; partes triginta, tertiam, & trigesimam.

30 22 Vbi horarum 14 & dimidiæ; partes 36.

36 Vbi horarum 15; partes 40, dimidiam, tertiam, & decimam.

40 56 Vbi horarum 15 & dimidiæ; partes 45.

45 Vbi horarum 16; partes 48, dimidiam, & trigesimam.

48 32 F Ducemus præterea & diametros eorum parallelorum, sumentes proprias cuiusque distantias ab æquinoctiali, in ipsa meridiani peripheria. distat enim tropici quidem diameter o p ab æquinoctiali partes proximæ

\* G



23, dimidiam, & tertiam: diameter uero H  
eius, qui prope tropicum, r s distat partes  
20, & dimidiam: & eius quæ dinceps sequi K  
tur, diameter c y, partes proxime 11, dimi  
diam, & sextam. Deinde & in unaquaque L  
earum describemus semicirculos: atque  
hos quidem cum propriis diametris indiui-  
los relinquemus. semicirculorum uero me-  
ridiani, qui circa æquinoctialem diametrū,  
utrumque diuidētes in æquales horarias di-  
stantias duodecim; diuisionum puncta no-  
tabimus: & similiter ea, quæ in diametro  
d g e fiunt a perpendicularibus ad ipsam  
ductis ex unaquaque diuisionum horaria-  
rum: quoniam hæc eadē manent in omni-  
bus cæli inclinationibus.

## COMMENTARIVS.

HACTENVVS de modo accipiendi quan-  
titates angulorum, circumferentiarum ue per li-  
neares, ut ipse appellat, demonstrationes. nunc de-  
scendit ad modum, quo quis easdē ex analéma-  
te, tanquam ex instrumento, facile accipiat: si-  
mulq; ostendit quo pacto analemma ipsum con-  
struatur. est autē analemma, ut in principio dixi-  
mus



mus communis sectio meridiani, & aliorum circularum. quorum alii quidem in omnibus caeli inclinationibus iidem manent, alii uero in unaquaque uariantur. nam meridianus, æquinoctialis, & tropici circuli, una cum reliquis quattuor parallelis eodem semper modo se habent: at horizon, & uerticulis alio, atque alio modo, pro uariis caeli inclinationibus. & quanquam, ut supra diximus, sex paralleli sint præter æquinoctialem: Ptolemæus tamē tres tantum diametros, quæ aliorum instar essent, in analemmate disposuit; duas quidem, ut ad eundem polum; tertiam uero paralleli eius, qui prope tropicum constituitur, ut ad polum oppositum; ne notæ semicircularum, qui circa eas diametros in meridiani plano describuntur, ipsæ sese confundant.

B Vtemurq; lata quadam, & ualde subtili norma.

Ptolemæus ad acceptiones duobus utitur instrumentis, nempe norma, & eo, quod græci καρίνον dicunt, nos circinum uertimus, quoniam circinus hoc loco eadem, quæ καρίνος, optime præstare potest.

C Deinde & ipsius g d rursum tertia parte ad g sumpta.

Describit seorsum quartam partē circuli æqualis meridiani, uidelicet h t k, quam & in nonaginta partes æqualiter diuidit, ad mensurandas, expo-



exponendasq; circuli meridiani circumferentias,  
quæ ex ipso analemmate accipiuntur.

Similiter & ex centro g, & eo interuallo, **D**  
quod est à g ad punctũ, quod bifariam se-  
cat ipsam a t, circulum describemus.

Rursus circulum l m n o extra meridianum de-  
signat, ut in eo partes altitudinis poli, quæ sunt in  
diuersis climatibus, notentur.

Itaque continet altitudo poli, ubi maxi- **E**  
ma dies & nox est 13 horarum.

Quæ sequuntur, cum in translatione corrupta  
essent, nos ex magna Ptolemæi compositione in  
hunc modum restituimus:

Ducemus præterea & diametros eorũ pa- **F**  
rallelorum.

Hæc ad analemmatis descriptionem pertinent.

Distat enim tropici quidem diameter o **G**  
p ab æquinoctiali partes proxime 23, dimi-  
diam, & tertiam.

Nam distat apud Ptolemæum in magna compo-  
sitione, partibus 23, minuta 51, secunda 20: nostris  
uero temporibus ex obseruatione constat distare  
partibus 23, min. 30.

Diameter uero eius, qui prope tropicũ r **H**  
s distat partes 20, & dimidiam.

Distat enim apud Ptolemæum partibus 20, m. **K**  
30, sec.



PTOLEMAEVS

30, sec. 9; sed hoc tempore partibus 20, m. 12.

K Et eius, qui deinceps sequitur, diameter  
e y partes proxime 11, dimidiam, & sextam.

Hæc ita emendauimus, quòd in translatione  
legebatur; partes 13, & tertiam. distat nanque Pto-  
lemæo partibus 11, m. 39, sec. 59. nunc uero parti-  
bus 11, m. 30.

L Deinde & in unaquaque earum descri-  
bemus semicirculos.

Circa diametros, quæ sunt communes sectio-  
nes meridiani, & parallelorum, semicirculi de-  
scribentur ad horarum distinctiones. circa æqui-  
noctialis uero diametrum ipsa meridiani circunfe-  
rentia descripta propriæ eius circunferentiæ in-  
star erit.

\* Tympano igitur æreo, uel lapideo exi-  
stente minime opus erit characteres delere:  
nam quæ in unoquoque climate uarian-  
tur, duæ uidelicet diametri, & horarum di-  
uisiones in superlinitionibus erunt. Quòd  
\* si ligneum tympanum sit superliniendum  
impressas notas, nigro quidem colore alias  
omnes, rubro autem meridianum, & dia-  
metrum æquinoctialem cum signis: & su-  
per totum tympanum cera, quemadmo-  
dum



dum in sphaëris, ut non simul cum uariandis superliniantur quæ debent remanere. His ita determinatis, facile in promptu nobis erit acceptionum unaquæque, si prius quidem apte, congruenterq; ad datam poli altitudinem diametros ducemus; horizon- tis scilicet, & gnomonis: deinde & tropici semicirculi sectionē distinguentem, quod est supra terrā ab eo, quod sub terra: utranque harum portionum in sex partes æquales diuidentes. postremo ad ipsam diametrum perpēdiculares lineas a factis diuisionibus perducemus. his enim solis contenti primum circuli hēctemorii peripherias in singulis horis accipiemus; has quidē ex portione paralleli supra terram, quæ sunt proprii signi; has uero ex ea, quæ sub terra, signi oppositi: deinde eas, quæ horarii omniū horarum; & quæ descensui. Rursus accipiemus eas, quæ meridiani: post eas, quæ uerticæ, & quæ horizontis. denique si uoluerimus, eas etiam, quæ sunt in æquinoctialis plano. quibus quidem peractis, notas ipsas abolebimus. Eodem modo facie-

K ii mus,



mus & in reliquis duobus parallelis utraque ex parte: & in ipso æquinoctiali: prioresq; diametros delentes, eas, quæ sunt subsequentis climatis ducemus. & ita quæcunque ad ipsorum climatum positas differentias pertinent, transigemus.

## COMMENTARIVS.

Si tympanum ex ære, uel lapide constabit, quæ communia sunt omnibus cæli inclinationibus, in ipso incidentur: quæ uero cuiusque propria, ut pote diameter horizontis, uerticisq; ac horarum diuisiones in semicirculis, aliquo colore inficiuntur, ita ut cum opus fuerit, aqua, aut alio liquore aspersa facile aboleri possint. Quòd si ex ligno constet, eorum, quæ sunt communia, notæ impressæ uariis distinguuntur coloribus: deinde cera tympano inducta, quæ propria sunt, insuper adiiicientur.

**B** Et super totum tympanum cera.

Quo pacto coloribus cera indueretur, docet Vitruuius libro septimo Cap. 9. his uerbis. Itaque primo locauit inducendos alios colores. at si quis subtilior fuerit, & uoluerit expolitionem miniatam suum colorem retinere: cum paries expolitus, & aridus fuerit, tunc ceram puniceam igni liquefactam paulo oleo temperatam seta inducat: deinde



deinde postea carbonibus in ferreo uase compo-  
 sitis, eam ceram apprime cum pariete calefaciun-  
 do sudare cogat; fiatq; ut peræquetur: postea can-  
 dela, linteisq; puris subigat, uti signa marmorea  
 curantur. hæc autem *καύσις* græce dicitur. Ita  
 obstans ceræ punicæ lorica non patitur nec lunæ  
 splendorem, nec solis radios lambendo eripere  
 ex his politionibus colorem.

Sed ut ratio, modusq; accipiendi periphe-  
 rias angulis subtensas ostendatur, sit meri-  
 dianus circulus, qui in analemmate a b g d  
 circa centrum e: & coniungantur per regu-  
 lam bene rectam a b quidem diameter, quæ  
 est communis sectio ipsius, & horizontis; g  
 d autem secundum gnomonem: ponaturq;  
 primum z e h æquinoctialis diameter, cu-  
 ius semicirculus z t h bifariam secetur in  
 t: & z t sit quarta supra terram. horariarum  
 autem, quæ in ipsa sectionum, una aliqua  
 sit ad K: & punctum, quod sit a perpendi-  
 culari per K ad z e ducta sit l. hæc enim a  
 principio sumpta fuerant. Itaque t K hec-  
 morii peripheriam ostendit: supra quam  
 statuentes circinum, & ad diuisam quartam  
 aptantes, exponemus gradus, qui in ipsa  
 conti-

A Regula bene  
 in Labendis arcibus

1. hora. 3. ab omni

B




43  
 nonp. 95. gubus  
 in sub hoda

PTOLEMAEVS

cōtinētur. continet autē semper tot gradus,  
 quot sunt tēpora æquinoctialia positarū ab  
 ortu horarum: & est eadem, quæ fit in pla-  
 no æquinoctialis. At horarii peripheriā ac-  
 cipiēmus, adducentes latæ illius normæ a l-  
 terum latus ad punctum l, ita ut alterum a-


ptetur ad  
 diamtrum  
 horizon-  
 tis ab  
 eo, quod  
 per l tran-  
 sit, secetur  
 C in m: ipsa  
 enim a m  
 horarii pe-  
 riphēria indicabit. Similiter si unum la-  
 tus adduxerimus ad l, ita ut alterum ad dia-  
 metrum gnomonis g d aptetur: atque ab  
 eo, quod per l meridianus secetur in n:  
 ipsa gn periphēria faciet eam, quæ est de-  
 scensiuī. Rursus az quidem per sese faciet  
 D eam, quæ meridiani. Quòd si statuerimus  
 circinum





## 40

# 1. L. due p<sup>re</sup> dicant  
 ad 9. etiam inter 10. et 11.  
 L. f. et quia equali  
 ante L. R. ad p<sup>re</sup> f.  
 10. et 11. f. m. hinc l<sup>re</sup>  
 ab 8. inter p<sup>re</sup> f. m.  
 indicat quicquid  
 inferat in L. 10. et 11.





PTOLEMAEVVS


tur. Rursus fit alia aliorum menstruorum  
diameter  $zh$   $tK$ , circa quam orientalis se-  
micirculus  $zl$   $K$ : & in eo accipiatur pun-  
ctum  $l$ , ita ut  $zl$  sit portio ipsius supra ter-  
ram, &  $lK$  sub terra. accipietur uero  $l$   
punctum per normam, si angulus adductus  
fuerit ad  $h$  ita ut alterum ipsius latus ad  $zh$   
aptetur. in

quo enim  
puncto al-  
terum la-  
tus semi-  
circulum  
secat, in eo  
statuatur

**F** l, quoniā  
ab h ipsi  
z h perpē  
dicularis

ducta communis sectio est planorum hori-  
zontis, & circuli menstrui. Diuidatur ergo  
utraq; portio in sex æquales partes: & di-  
uisionum puncta notentur: deinde per ap-  
positionē normæ & in  $zK$  notentur signa.

omnibus totus in 12. partes distribu<sup>8</sup> facta



hæc dimidio, idcirco **G**  
ita fit quia diem tot  
facionem in 12. horas  
multo distribuere, et ei  
naturalem velox in 24  
equaliter partes horas  
distribuere, effect same  
bus initio, excepto per  
egressu solis in .l.: s

stromiculus totus in 12 partes distributa  
 ut hexalogum esset constans, 12. si ab  
 i. a meridie in 2. si ab aequinoctio in 1.



# DE ANALEMMATE.

41

facta a perpendicularibus, quæ per semicirculi diuisiones ad ipsam ducuntur. Sit autem una earum, quæ supra terram in m, cui respondens in zh sit n: & ex centro quidem n, interuallo autem nm fumatur punctum in meridiano x: alteroq; normæ latere ad puncta en adducto, ita ut meridianum secet in o, ipsa quidem xo faciet reliquâ in quartam peripheriæ hectemorii. quæ autem est inter x, & sectionem meridiani factam ab altero normæ latere, ostendet eam, quæ hectemorii peripheriam. Similiter si ex centro h, & interuallo hm fumatur punctum p in meridiano, peripheria ap faciet eam, quæ horarii. & si ex centro t, interualloq; tm fumatur in meridiano punctum r, peripheria gr faciet eam, quæ descensui. Rursus a o quidem peripheria faciet eam quæ meridiani. Si autem unum normæ latus apposerimus ad n, reliquo aptato ad ge: & circini distensionem habentis æqualem ipsi nm, alterum quidem terminum applicauerimus ad portionem ge, quæ penes angulum rectum; alterum uero ad latus, quod

quod sit ut p puncta signa  
in circinfessione mensur  
circuli ut pote minoris  
maioribus, & transfectionibus  
ad maiores circulos in  
quibus diametris minoris  
puncta & ita eam habetur in  
hunc circuli mensuram  
a g b k. Nam in a b  
Hanc si transfectionem a  
circinfessione & in l m  
normæ puncta n. immobilit  
Kad maiore contingit me  
ridianum in x. habetur  
qz ita inter meridiana  
circuli, cui altera huius  
\* altera circinfessione punct  
a. plam meridiana  
tingent. Et quia hec  
L motus in sectione est  
in et horarii. e. mobilis  
p corpus solare in quod  
transfectionem in suo hunc  
ho. n. huius meridiana  
in o. ut huius eo. ostendit  
sit. Si uersus x signum  
sidonis ab m. circinfessione  
ad minoris due huius  
hi, quod maioris  
meridiani mensuram  
quod Stol p norma  
sem nequi agitur sup  
e. circinfessione a linea in  
dimensio. ex omni  
causa uersus q. apone  
bit in eadem quod  
circinfessione, quod huius  
q o. huius o. x.  
hi obsequia quomodo puncta sidonis in  
minoris circinfessione presentibus ad maiore circinfessione in qua  
diametris minoris puncta sit constituta. Primum a sua circ  
infessione quodq; puncta ducitur ad sua diametris p perpendicularibus  
postea p quodlibet circula p perpendicularibus contingitur circuli maior  
diametris inuestigamus in puncta quod p meridiana a centro  
ad circinfessione sup sidus solari. semper ostendit ut

Ex hoc  
posuimus  
et horarii  
sequitur  
hectemorii  
Angulus  
meridiani

circinfessione sup meridiana ho. eo. per  
motus sit a q ad x. motus residuum quod q o. huius o. x.  
hi obsequia quomodo puncta sidonis in  
minoris circinfessione presentibus ad maiore circinfessione in qua  
diametris minoris puncta sit constituta. Primum a sua circ  
infessione quodq; puncta ducitur ad sua diametris p perpendicularibus  
postea p quodlibet circula p perpendicularibus contingitur circuli maior  
diametris inuestigamus in puncta quod p meridiana a centro  
ad circinfessione sup sidus solari. semper ostendit ut




*punctus unus sit communis utriusque superficie plano ad quod punctum trahatur, et a quo trahatur ad qualem circumferentiam quiescat. Vide quomodo resolutione & constructione ad demonstrationem debeat perferri quicquid transierit*

PTOLEMAEVS

*verticalis*

per n: deinde hoc manente cōuerterimus idem latus, seruata ipforum coniunctione, ad e centrum, ita ut in s meridianum secet, g s periphēria faciet eam, quæ circuli uerticālis. Rursus si unum laterum apposuerimus ad n, altero aptato ad a e; & circini distensionem ipsi m n æqualem habentis, alterū terminū adduxerimus ad



portionē a e, quæ penes angulū rectum; alterum ad latus per n: deinde hoc manente idem latus, seruata ipforū coniunctione, conuerterimus ad centrum e, ita ut meridianum in c secet: ipsa g c periphēria faciet eam, quæ horizontis. ceterum si ipsi m n ponentes æqualem e y: applicaue-

*Horiz. Verticalis  
qui et Lat. merid.  
Lor. hor.*



DE ANALEMMATE. 42

cauerimus ad  $y$  rectum angulum uno latere  
ad  $e$  y aptato: & circini distensionem ha-  
bentis æqualem ipsi  $h n$ , alterum quidem \*  
terminū apposuerimus ad  $y$ , reliquum ue-  
ro ad alterum latus; & hoc manente, idem  
latus seruata ipsorum coniunctione, con-  
uerterimus ad centrum  $e$ , ita ut secet meri-  
dianum in  $f$ : peripheria  $g f$  faciet eā, quæ  
in plano æquinoctialis.

*Æquinoctialis*

COMMENTARIUS.

ACCEDIT ad modum accipiendi, & expo-  
nendi circumferentias angulis subtensas. idq; pri-  
mum, ut solet, cum sol in æquinoctiali circulo  
conuertitur: postea uero cum & in aliis parallelis.

Itaque  $t K$  hectemorii peripheriam o-  
stendit. B

Superius enim demonstratum est, in æquino-  
ctiis angulos hectemorii, & qui in plano æquino-  
ctialis fiunt, eosdem esse, quoniam hectemorios  
per totam conuersionem æquinoctiali congruit.  
circumferentiam igitur  $t K$  huic angulo subiectā  
circino excipiemus, & ad diuisam quartam  $h t k$   
aptantes, exponemus partes, siue gradus, qui in  
ipsa continentur.

Ipsa enim  $a m$  horarii peripheriā indicabit. C

L ii




PTOLEMAEVS

Nam si per l punctum ad diametrum a b perpendicularis ducatur, quæ meridianum secet in m; ipsa a m erit horarii circumferentia. & pariter si per idem punctum ducatur perpendicularis ad diametrum g d, secans meridianum in n; erit g n circumferentia descensui. quæ omnia superius demonstrata sunt.

D Quod si statuimus circunū super puncta K & l.

Demonstrauimus enim si ex perpendiculari per l ducta ad g d diametrum, abscindamus æqualem lineæ K l, incipientes a termino, qui est in ipsa g d; & per alterum eius terminum, ac centrum ducatur linea meridianum secans in x, esse ipsam g x uerticalis circumferentiam. Et rursus si ex perpendiculari per l ad diametrum a b perducta abscindemus eidem æqualem factio initio ex parte a b, & per alterum terminum





minum ac cētrū linea ducatur, quæ meridianū in  
o secet, ipsam g o horizontis circumferentiā esse.

Atque in his quidem peripheriis, & in E  
omnibus semper intelligendum, ne idem  
sæpius repetatur.

Non aliam ob causam ullam in tympano circuli  
quartam seorsum diuidi uoluit, nisi ut earū circun-  
ferētiarum partes ex ipsa sumptæ exponerentur.

Quoniam ab h ipsi z h perpendicularis F  
ducta communis sectio est planorum hori-  
zontis, & circuli menstrui.

Cum enim & menstrui paralleli omnes, & hori-  
zon ad meridianum recti sint, communes ipsorum  
sectiones ad eius planum perpendiculares erunt. 19 undeci-  
mi.  
quare & ad omnes rectas lineas, quæ in eodem  
plano ipsas contingunt.

Diuidatur ergo utraque portio in sex æ- G  
quales partes.

Sunt enim hæ portiones oppositorum signorū,  
ut si portio z l sit arcus semidiurnus in principio  
Capricorni; erit l K arcus semidiurnus in princi-  
pio Cancrī, & ita in aliis; id quod ipse inferius de-  
clarat.

Alteroq; normæ latere ad puncta e n ad- H  
ducto.

Hoc ita intelligendum est propter ea, quæ se-  
quun-



PTOLEMAEVS

quantur, ut normæ angulus in centro e statuatur.

**K** Ipsa quidē  $xo$  faciet reliquam in quartam peripheriæ hectemorii.

Hoc est  $xo$  erit reliqua pars circumferentiæ hectemorii, quæ quartam circuli complet. quod recentiores complementum uocant. Sumetur autem ipsa, si normæ angulo ad centrum e aptato, & uno eius latere ad  $e n$ , alterum in puncto  $q$  meridianum secet. est enim  $x e q$  angulus hectemorii, quod demonstraui superius. ergo &  $x q$  eius circumferentia erit.

**L** Similiter & si ex centro  $h$ , & interuallo  $h m$  sumatur punctum  $p$  in meridiano.

Nam quæ per  $n$  ad  $a b$  perpendicularis ducitur, perueniet ad ipsum  $p$ , quod nos iam demonstraui. quare  $a p$  horarii circumferentia comperietur. & eadem ratione per  $n$  ducta ad  $e g$  perpendicularis ad  $r$  pertinebit. erit igitur  $g r$  descensui circumferentia.

**M** Ceterum si ipsi  $m n$  ponentes æqualem  $e y$ , applicauerimus ad  $y$  rectum angulum,

Corruptus est, ut opinor, hic locus in translatione, quem nos ita correximus. ducta enim  $h m$ , angulus  $h m n$  erit is, qui in plano æquinoctialis constituitur, ut monstratum est. sumatur autem  $e y$  in linea  $e g$ , quæ sit æqualis ipsi  $m n$ : & aptato altero normæ latere ad  $e y$ , ita ut eius angulus



## 44

& angulus  
ad y rectus  
æqualis re-  
cto ad n.

quare & ba

fis eu ba-  
fi hm to-

tumq; trian

gulum toti

triangulo,  
& anguli an

gulis æqua

les, quibus  
equalia late

hoc est ge

co circunfer

no æquino

Nunc a


Itas nolt  
unius per

quius par.



ks, Copyright © 2010 P  
by courtesy of the Bibliot

---



Nunc autem si diameter  $z$   $K$  ad fin-  
istras nostri partes positionem habens, sit  
unius parallelorum mēstruorum, qui ma-  
gis




PTOLEMAEVS

gis australes sunt, quàm æquinoctialis, trans-  
lato tympano ad positionem ex opposito  
z K; & qui circa ipsam semicirculus ad dex-  
tras partes erit in eodem situ, in quo paral-  
lelus descriptus per opposita signa, quæ ma-  
gis septentrionalia sunt, quàm æquinoctia-  
lis; & K l

portio su-  
pra terrā  
erit, z l  
autē sub  
terra. qua  
re cum in  
diuisioni-  
bus por-  
tionis K l  
ita feceri-  
mus, ut in

iis, quæ ostēsa sunt, inueniemus & eas peri-  
phas, quæ fiunt in oppositis signis. nā iu-  
xta diametrū z K, quæ in hyemali tropico  
accepta est, semicirculi portio z l faciet eas,  
quæ in principio capricorni consistunt su-  
pra terram angulorum peripherias: & por-  
tio





tio Kl eas, quæ in principio Cancr. iuxta uero eam, quæ menstrui subsequenti hyemalem tropicum posita ipsa z K, semicirculi quidem portio z l faciet eas, quæ in principio Sagittarii, & Aquarii supra terram peripherias: At portio l K eas, quæ in principio Geminorum, & Leonis. Postremo iuxta diametrum menstrui, qui est prope æquinoctialem, accepta ipsa z K, portio semicirculi z l faciet peripherias, quæ in principio Scorp. & Piscium supra terram cōsistunt: l K uero eas, quæ in principio Tauri, & Virginis. nam quæ in principio Arietis, & Libræ fiunt, in unaquaque æquinoctialis quarta easdem esse, iam demonstratum fuit.

## COMMENTARIUS.

OSTENDIT qua ratione parallelorū menstruorum tres tantum diametri præter æquinoctialem, in analemmate descriptæ satis sint.

Itaque anguli ab antiquis determinati, quos non eodem modo, quo nos, exposuerunt, ex his ipsis in prōptu habebuntur. An

M gulum



PTOLEMAEVS

gulum enim circuli, qui a nobis hectemorios appellatur, ut diximus, non assumpserunt: aliorum uero, qui horarii, qui in plano uerticulis, & qui in æquinoctialis plano iidem sunt, qui apud nos, & qui ab ipsis uocatur hectemorios idem, qui apud nos meridianus. At reliquorum, descensuum qui dem faciunt residuum ad unum rectum descensui, qui apud nos. eum uero, qui antiscios ab ipsis dicitur, rursum residuum faciunt ad unum rectum eius, qui apud nos horizontis.

COMMENTARIVS.

REPETIT ea, quæ superius dixit multis in locis. in quibus scilicet consentiat cum antiquis mathematicis, & in quibus dissentiat. est enim hectemorii angulus apud Ptolemæum, qui continetur radio, & diametro æquinoctiali, quem antiqui prætermiserunt. Meridiani angulus, qui declinatione hectemorii ab horizonte continetur; hunc antiqui hectemorion appellarunt. Horarii angulus, qui ex radio, & diametro meridiani constat, idem, qui apud antiquos. Verticalis angulus constat ex declinatione horarii circuli a meridiano, qui antiquis est angulus in plano uerticulis.

Descensui



Descensui angulus solis radio, & gnomone continetur, cuius reliquum, qui rectum angulum perficit, antiqui descensuum uocarunt. Horizontis angulus est is, quem facit declinatio descensui ab ipso uerticali. huius reliquum, antiqui antisicion dixerunt, eum scilicet, qui declinatione descensui a meridiano circulo comprehenditur. Angulus autem in plano æquinoctialis antiquis, ac Ptolemæo, qui a communi sectione horarii, æquinoctialisq; & æquinoctiali diametro efficitur.

Distracto autem quodammodo æquinoctialis plano acceptiones fieri, ex his facile le apparet. ostendit enim & hoc eam, quæ est circuli horarii, positionem. hanc tamen cõtinet proprie uerticæ peripheria ex iis, qui per polos horarii describuntur, cum sit unus trium circulorum, qui a principio necessario adhibebantur, seruantium ubique positionẽ inter sese ad rectos angulos. quapropter & hec temerarii quidem peripheria, pro qua eam, quæ æquinoctialis assumpserunt, non solum cum ea, quæ horarii positionem radii ostendit, sed & cum ea, quæ meridiani. quæ autem æquinoctialis cum sola ea, quæ horarii: & non item cum ea,

M ii quæ



# PTOLEMAEVS

quæ meridiani: nec cum aliqua alia reliqua-  
rum: quoniam neque ex proprietate circu-  
lorum, qui mouentur, radium semper com-  
prehēdit, præterquā in æquinoctiis: neque  
ex proprietate manentium eandem ad reli-  
quos ubique seruat positionem. Itaque ex-  
posuimus & non consistentes quantitates  
\* secundum illum, quem ostendimus modū  
consequentium rationi peripheriarum.

## COMMENTARIVS.

Distracto autem quodammodo æquino-  
ctialis plano.

Translatio sic habet. Quod autem distracto p.  
» quidem plano æquinoctialis accipitur, & per ta-  
» le palam fit. Ex quibus uerbis quid sibi uelit Pto-  
lemæus, non satis elici potest. uidetur tamen af-  
ferre rationem, cur ab antiquorum decretis recede-  
re coactus sit. Nam cum positiones, inclinationes  
ue circulorum per lineas perpendiculares proprie-  
dimetiamur, uidelicet per eos circulos, qui inter  
fese recti sunt: non oportuit antiquos in his æqui-  
noctialis plano uti. quanquam enim æquinoctia-  
lis horarii positionem ostēdere possit, illud tamen  
multo aptius facit uerticālis ipse, qui ad horariū  
rectus est. quare & circumferentia hēctemorii, pro  
qua æquinoctialis circumferentiam assumpserunt,  
non



non solum cum ea, quæ est horarii, sed & cum ea, quæ meridiani, radii positionem ostendit. At æquinoctialis circumferentia cum sola ea, quæ horarii, non item cum ea, quæ meridiani, nec cum alia aliqua reliquarum: quoniam neque naturam circulorum, qui mouentur, continet: non enim radium comprehendit, præter quàm in æquinoctiis: neque rursus naturam continet circulorum manentium, quòd non eandem ad reliquos ubique positionem seruat.

In subiectis autem septem parallelis, & iuxta unumquodque principium signorù, & horarum canones confecimus, qui continent pertractatum a nobis ordinem in omnibus quantitatibus, quæ adiciuntur, ut & acceptiones eas, quæ in declinationibus, & peripherias in meridiano circulo determinatas: orientaliioresq; ipso, & occidentaliiores positiones horarù in promptu habemus. tum peripherias in circulo uerticali, quæq; magis septentrionales sunt, & quæ magis australes positiones radiorù: in quibus consequentiâ diximus oportere exquirere. Adscripsimus singulis horis signa, per quæ eam, quæ ad septentrionales circuli uerticis

\*



ticalis partes uergit: & rursus quæ ad austra-  
les, radii positionē licebit intelligere ab iis  
ipsis, quæ determinata sunt, principium fa-  
\* cientes. Per quantitates uero adiectas facile  
erit, & coniugationes, a quibus positio ra-  
dii determinatur, cognoscere; quas sex nu-  
mero esse accidit: tres quidem ab iis circu-  
lis, qui mouentur, inter sese coniunctis; ut  
hectemorii ad horarium, hectemorii ad de-  
\* scensiuum, & horarii ad descensiuum: tres  
uero ab unoquoque circulatorum, qui mo-  
uentur, ad eum, qui manet, quiq; ipsius  
inclinationem excipit; ut hectemorii ad me-  
ridianum, horarii ad uerticalem, & descen-  
siui ad horizontem. Canones autem hoc  
modo se habent.

CANCRI



*in hanc nominum et ordinem distributionem vide regem sup folio 9.*

48

# CANCRI PRINCIPII, HORARVM XIII.

horæ hori- zontis	hectemo- rie	horariæ	Descen- sive	Meridia- ne	Vertica- les	horizon- tales
Bo. 1 11	24 15	69 15	90 0	0 0	90 0	24 15
Bo. 2 10	25 15	73 0	75 10	35 15	69 50	20 0
Bo. 3 9	34 20	77 30	60 55	60 45	60 0	18 50
Bo. 4 8	46 50	79 10	46 5	72 10	45 5	17 15
Bo. 5 7	60 10	81 20	31 0	78 30	30 10	18 0
Bo. me- ridies	75 0	82 35	17 30	81 30	15 10	27 0
	90 0		7 25	82 35	0 0	90 0

*Respondenda hic si  
gura q est in calce  
libri post indicem  
ga in idem errata  
fuit.*

*Anguli de radio et diametro Anguli planorum meridiani et non meridiani*  
COMMENTARIUS.


PTOLEMAEVS ut totam hanc materiam  
latius explicaret, tabulas confecit, in quibus cir-  
cunferentiarum omnium magnitudines, quæ in  
septem climatibus fiunt, sole principium cuiusli-  
bet signi tenete, & ad singulas horas mirifico ordi-  
ne disposuit adeo, ut quæ meridianæ, quæue orien-  
tales, & occidentales radiorum positiones essent  
facile intelligeretur. rursus quæ in uerticali circu-  
lo, & quæ australes, septentrionalesq; simul ue-  
ro cognoscerentur & coniugationes, a quibus  
ipsæ radiorum positiones determinantur. Hæ ta-  
men tabulæ iniuria temporum in manus nostras  
non peruenerunt. extat enim earum principium  
tantummodo, quod nec mendis caret. His igitur  
ita positis, atque explicatis, multa genera, & ua-  
rietates horologiorum describere licebit. Verum  
quoniam illud non omnibus promptum est, cu-  
rabimus, ut, qua id ratione facile fiat, breuiter,  
sum-



# PTOLEMAEVS

summatimq; ostendamus : non tamen omnia, sed  
præcipua, & quæ magno usui esse possunt, gene-  
ra persequemur, ab ipso analemmate exordium  
cipientes.

## ANALEMMA





49

FEDERICI COMMANDINI  
VRBINATIS LIBER,  
DE HOROLOGIORVM DESCRIPTIONE.

**D**ESCRIBATUR in plano circulus meridianus  $abcd$ , cuius centrum  $e$ : & ductis diametris  $ac$ ,  $bd$ , quæ sese ad rectos angulos secent, quarta  $cd$  in partes 90 æquales diuidatur: à puncto autē  $a$  ad  $d$  sumantur circumferentiæ  $af$ ,  $ag$ , ita ut  $af$  sit partium eiusmodi 23, m. 30;  $ag$  uero partium 11 m. 30. Rursus ab eodem puncto ad  $b$  sumpta circumferentia  $ah$ , quæ partes 20, m. 12 contineat, per puncta  $fg$   $h$  usque ad alteram circumferentiæ partem lineæ  $fk$ ,  $gl$ ,  $hm$ , ipsi  $ac$  æquidistantes ducantur. Itaque si  $ac$  intelligatur æquinoctialis diameter, &  $bd$  mundi axis, ut  $d$  sit polus arcticus,  $b$  antarcticus; erit  $fk$  tropici æstiuæ diameter, hoc est paralleli eius, qui per Cancrum transit;  $gl$  diameter paralleli, qui per Taurum, & Virginem; &  $hm$  eius, qui per Sagittarium, & Aquarium. quæ quidē tres diametri triū quoque reliquarum instar erunt. Deinde circa diametros  $fk$ ,  $gl$ , describantur semicirculi ad partes  $d$ : & circa  $hm$  ad partes oppositas alius semicirculus describatur, ne linearum confusio molestiam nobis exhibeat. postremo semicirculum meridiani  $abc$  diuidentes in duodecim partes æquales, puncta,

N      cta,




## DE HOROLOGIORVM

cta, in quibus perpendiculares ab his ductæ ad diametrum  $a c$ , ipsam secant, notabimus. Hæc sunt, quæ in omnibus cæli inclinationibus requiruntur, analemmatis lineamenta. Quæ uero cuiusque inclinationis propria deinceps exponentur, ita addenda sunt, ut facile aboleri possint. nam quot gradibus polus ab horizonte eius loci sese tollit, in quo horologia describemus, tot partes sumuntur a puncto  $d$  ex parte  $c$  usque ad  $n$ . sumantur autem nunc exempli causa partes 42 iuxta cæli inclinationem, quæ est Romæ. postea per  $n$ , & circuli centrum ducatur recta linea  $n e o$ , & per  $e$  ad ipsam perpendicularis alia ducatur  $p e q$ , ut  $n o$  horizontis diametrum repræsentet, &  $p q$  diametrum uerticæ, quæ græce gnomon appellatur. ubi uero  $n o$  lineas  $f k$ ,  $g l$ ,  $h m$ , secat, sint puncta  $r$ ,  $s$ ,  $t$ . à quibus perpendiculares ipsis diametris ad suos semicirculos ducantur  $r u$ ,  $s x$ ,  $t y$ . erunt hæ horizontis, ac parallelorum communes sectiones, quod demonstratum est. et semicirculi quidem  $f u k$  erit  $u f$  portio Cancræ,  $u k$  Capricorni. semicirculi uero  $g x l$  portio  $x g$  Tauri, & Virginis;  $x l$  Scorpii ac Piscium; & semicirculi  $h y m$  portio  $y h$  Sagittarii, Aquariiq; & ipsa  $y m$  Geminorum ac Leonis. nam semicirculus  $a b c$  meridiani, instar æquinoctialis bifariâ diuiditur in portiones  $a b$ ,  $b c$ , quæ Arieti, ac Libræ debentur. Si igitur antiquorum more, & ut tradit Ptolemæus, horologia describenda sint, semicir-



## 50



N ii ma



## DE HOROLOGIORVM

ma diuifio, primæ & undecimæ horæ finis; secunda finis secundæ ac decimæ; tertia tertiæ, ac nonæ; & ita in reliquis. Si uero, ut nunc in Hispania, Gallia, Germania fieri solet, horologia describamus, quæ nonnulli recte astronomica appellant; factio initio a meridie, semicirculorum portiones in partes horarum æqualium, siue æquinoctialium diuidentur: quarum quælibet gradus quindecim continet proprii circuli: ut ipsa parallelorum, ac meridiani communis sectio sit principium horæ primæ, & duodecimæ finis: post quā prima diuifio sit finis primæ, atque undecimæ horæ; secunda secundæ, & decimæ; tertia tertiæ, ac nonæ; & ita deinceps. Quod si horologia nostra, hoc est Italica describere libeat, à communi sectione horizon-  
tis & paralleli cuiusque exorfi spatia horarum dimetiemur, ita ut cum ad meridiem deuentum fuerit, rursus per eundem semicirculum eò regrediamur, unde primum digressi sumus: sitq; ipsa communis sectio uigesimæ quartæ horæ finis; prima autem diuifio finis uigesimæ tertiæ; secunda uigesimæ secundæ; tertia uigesimæ primæ; & eodem modo in iis, quæ deinceps sequuntur. non aliter faciemus, si diei initium ab ortu solis, quemadmodum olim apud Babylonios, nunc apud Baleares, ut accepimus, sumatur. erit tamen communis sectio, horæ primæ principium: cuius quidem finis erit ipsa diuifio prima; secunda diuifio finis secundæ; tertia tertiæ, & ita

*horologia Astronomica*

*horologia Italica*


*Babilonica ab ortu  
solis*





# DESCRIPTIONE. 51

& ita in aliis: quoniam superius à termino communis sectionis, tanquam occidentali, nunc ab eo tanquam orientali incipimus: quanquam horarum diuifio multo facilior, ac planior fuerit, præsertim ubi diē uel ab occafu, uel ab ortu exordimur: fi parallelorum integros circulos feorsum



describentes una cum communibus sectionibus, ipsosq; & ipsorum diametros eo pacto diuidamus: alias ab occafu, alias ab ortu initium fumentes, ut in subiectis figuris apparere potest.


Ex



## DE HOROLOGIORVM

Ex quibus perspicuum est, qua ratione ex analemmate ipso dierum quantitates quolibet anni tempore, & in qualibet regione, cuius latitudo nota sit, facile cognoscamus.

Itaque his explicatis ad singulas horas circumferentiæ omnes, de quibus a Ptolemæo in libro de



analemmate dictum est, inueniantur, ac signis notentur; hæc memoria scilicet, horaria, descensuæ, meridianæ, uerticales, & horizontales, adeo, ut, cum opus fuerit, ipsis æquales exhibere possimus.

De



## De horologiis horizontalibus.


Ad horologium igitur in horizontis plano describendum duæ circumferentiæ satis sunt, descensiuæ & horizontales: nanque ex descensiuæ umbræ longitudo, ex horizontalibus distantia horizontalis, seu latitudo determinatur. Vt autem ab eo, de quo Ptolemæus agit, ordiamur; sit primæ, & undecimæ horæ Cancræ circumferentia descensiuæ  $p\alpha$ , horizontalis  $p\beta$ : secundæ & decimæ horæ descensiuæ  $p\gamma$ , horizontalis  $p\delta$ : tertiæ & nonæ descensiuæ  $p\epsilon$ , horizontalis  $p\zeta$ : quartæ & octauæ descensiuæ  $p\eta$ , horizontalis  $p\theta$ : quintæ ac septimæ descensiuæ  $p\iota$ , horizontalis  $p\kappa$ . Rursus primæ, & undecimæ horæ Capricorni descensiuæ circumferentia sit  $q\lambda$ , horizontalis  $q\mu$ : secundæ ac decimæ descensiuæ  $q\nu$ , horizontalis  $q\xi$ : tertiæ ac nonæ  $q\omicron$ ,  $q\pi$ : quartæ & octauæ  $q\rho$ ,  $q\sigma$ : quintæ, ac septimæ  $q\tau$ ,  $q\upsilon$ . Itaque primum gnomonis, qui est horarum index, altitudinem constituere oportet: cui æqualem à linea  $e\zeta$  abscindemus, uidelicet ipsam  $e\zeta$ : & per  $z$  lineam  $on$  æquidistantem ducemus  $\phi\chi$ , quæ æquinoctialis diametrum in puncto  $\psi$  secet. erit centrum  $e$  tanquam gnomonis uertex, &  $\phi\chi$  tanquam communis sectio, orientis, ac meridiani; ita ut  $z\psi$  sit longitudo umbræ æquinoctialis, quæ in meridie efficitur: quoniam enim tota terra puncti, ac centri rationem ad sphaeram solis habere uidetur; nihil

*inuasib*



## DE HOROLOGIORVM

hil differet centrum e à gnomonis uertice, neque planum per  $\phi\chi$  transiens, & ad meridianum rectum ab horizontis plano, cui gnomonis umbræ occurrunt. sed tamen differentia causa nobis planum illud horologii planum appellare libuit. Præterea cum gnomonis uertex e sit in æquinoctia-



lis plano, umbræ ipsius æquinoctii tēpore ab eo non recedent. quare in plano horologii terminabuntur à cōmuni sectione ipsius & æquinoctialis. quæ quidē cōmunis sectio per  $\downarrow$  trāsiens ad meridianum




dianum, & idcirco ad ipsam  $\phi\chi$  erit perpendicularis: quoniam & æquinoctialis & horologii utraque plana ad meridianum recta sunt. Umbra autem Cæcri, & aliorum parallelorum, qui sunt ex eadem parte, ad singulas horas determinabuntur lineis per centrum & per fines circumferentiarum descensuarum ductis, adeo, ut ipsam  $\phi\chi$  secant. Si enim per  $a$ , quod solis altitudinem ostendit, & per  $e$  ducatur linea usque ad  $\phi\chi$  in  $\omega$ : erit  $z\omega$  longitudo umbræ in prima & undecima hora: & ita in aliis, ut constat ex iis quæ Ptolemæus in secundo magnæ compositionis libro, capite quinto scripta reliquit. Eadem ratione Capricorni umbræ, & reliquorum parallelorum inuenientur, ducta nimirum ex altera parte  $o$  n linea ipsi parallela, quæ tantum distet, quantum ipsa  $\phi\chi$ , hoc est, quanta est gnomonis altitudo. Itaque in plano, quod per  $\phi\chi$  transit intelligatur circulus  $ABCD$ , descriptus circa centrum  $E$ , æqualisq; meridiano, qui est in analemmate: & ducantur  $AC$ ,  $BD$  diametri secantes sese ad rectos angulos;  $AC$  quidem communis sectio ipsius, & uerticæ;  $BD$  uero eiusdem & meridiani, ita ut  $A$  ad occidentem,  $C$  ad orientem,  $B$  ad meridiem, &  $D$  ad septentrionem spectet. Deinde ex centro  $E$  in linea  $ED$  sumatur linea æqualis  $z\psi$ : & per terminum eius ducatur  $GH$ , ipsi æquidistans. erit ex iis, quæ proxime diximus,  $AC$   $GH$  communis sectio huius plani, & æquinoctialis: ideoq; æquinoctialis linea appellabitur, 19. undecimi.

O quod



# DE HOROLOGIORVM

quòd umbrarum æquinoctialium finis sit, ac terminus. collocatur enim gnomon in centro E ad planum  $\phi\lambda$  rectus, cuius altitudo æqualis est ipsi  $ze$ . Quoniã igitur circumferentia horizontalis horarum quidem primæ Cancrī  $p\beta$  à termino uerticālis orientali; undecimæ uero à termino occidentali



ad septentrionem declinat: accipiantur à punctis A C ex parte D circumferentiæ AI, CK ipsi  $p\beta$  æquales: perq; I & centrum E ducatur linea occulta IEL, & per K & E alia ducatur KEM. postremo



mo a centro E in linea EL sumatur EN, & in linea EM sumatur EO, ut sint æquales longitudini umbræ  $z\omega$ , quæ in dictis horis apparet: erit punctum O terminus umbræ in hora prima Cancrī, & N terminus in undecima. cum enim in prima hora positio radii orientalis, septentrionalisq; sit; gnomonis umbra ad occidentis partem oppositam, & meridianam proiicitur: & in undecima, cum sit occidentalis, proiicitur ad orientem. Non aliter ex data circumferentia horizontali in secunda, & decima hora, & gnomonis umbræ longitudine, earum termini inuenientur, qui sint P, Q. In tertia uero, ac nona, & reliquis, circumferentiæ à punctis AC ad partes B accipientur, quòd puncta  $\zeta\theta\kappa$  à uerticali ad meridiē declinant. quare pro cuiusque umbræ lōgitudine termini ad septentrionis partes oppositas notabuntur. Eodem modo & umbrarum terminos, qui in horis Capricorni, & aliorum parallelorum constituuntur, inueniemus. Quibus rite peractis terminos primæ, ac undecimæ horæ Cancrī cum terminis primæ, ac undecimæ Capricorni, & terminos secundæ, ac decimæ Cancrī cum terminis secundæ, & decimæ Capricorni ductis lineis cōiungemus; & ita deinceps, quousque horarum omnium lineæ absolutæ fuerint. transibunt enim hæ & per terminos earundē horarum tam in æquinoctiali, quàm in aliis parallelis; cum sint cōmunes sectiones plani, in quo horologia describuntur, & maximorum circulorum,

O ii qui



## DE HOROLOGIORVM


15. quinti.

qui parallelos omnes in ipsis diuisionum punctis  
secant, ut mox demonstrabitur. Quoniā enim in  
horizonte obliquo parallelorum æqualiter distan-  
tium ab æquinoctiali, arcus diei unius æqualis est  
arcui noctis alterius: & quanto dies augentur, so-  
le ab æquinoctio ad Cancrum tendente, tanto mi-  
nuuntur tendente eo ad Capricornum: sequitur,  
ut dies Cancrī tāto maior sit æquinoctiī die, quan-  
to dies Capricorni est minor. Cū igitur arcus diur-  
nus cuiuslibet paralleli in duodecim partes hora-  
rias æqualiter diuidatur: eadem erit proportio par-  
tis ad partem, quæ est totius ad totum. quare ar-  
cus horæ Cancrī eadem quantitate superabit arcū  
horæ æquinoctialis, qua arcus horæ Capricorni ab  
eo superatur. & ita in aliis parallelis, qui ab æqui-  
noctiali pari distant interuallo. Sit in sphæra cir-  
culus parallelus Cancrī a b c d, cuius polus e;  
æquinoctialis f g h k; parallelus Capricorni l m  
n o; & horizon obliquus, qualis Romæ l f a p d  
k o. ex eodem autem centro describatur circulus  
p q, tangens horizontem in p, qui erit parallelo-  
rum semper apparentium maximus. deinde paral-  
leli Cancrī, & æquinoctialis arcus, qui sunt supra  
terrā in duodecim partes æquales diuidantur: ut sit  
paralleli quidem Cācri prima diuisio punctum b,  
secunda c: æquinoctialis uero prima diuisio g, & h  
secunda. postremo per pūcta b g ex uigesima pro-  
positione primi libri sphæricorum Theodosii de-  
scribatur circulus maximus, secans Capricorni  
parallelum



DESCRIPTIONE. 55

parallelum in puncto m, & per ch alius describa-  
tur, qui eundem in n secet. Dico circulum b g m  
etiam per primā paralleli Capricorni diuisionem  
transire: & ch n per secundam: hoc est l m esse  
arcum primæ horæ Capricorni, & m n secundæ.  
Describantur enim ex quintadecima secundi libri




sphæricorum Theodosii, alii duo circuli maximī;  
tangentes parallelum p q: alter quidem per g, qui  
secet parallelum Cancrī in r, & parallelum Capri-  
corni in s: alter uero per h, parallelum Cancrī  
secans



# DE HOROLOGIORVM

secans in t, & Capricorni in u. Quoniam igitur circuli maximi p a f l, r g s, t h u, tangunt parallelum p q, & alios secant: erunt ex tertiadecima secundi libri sphæricorum, a r, f g, l s; itemq; r t, g h, s u arcus horarum æquinoctialium inter se similes: quorum a r, l s, r t, s u etiam sunt æquales.



& quoniam circuli a b c d, l m n o, æquales & paralleli ex utraque parte circuli f g h k, qui & ipse parallelus est, circulorum maximorum æquales portiones rescant, ut apparet ex decima octaua



DESCRIPTIONE. 56

ua secundi sphaericorum : arcus  $rg$ ,  $gs$  æquales  
erunt; itemq; æquales ipsi  $bg$ ,  $gm$ . quare ex ter  
tia tertii sphaericorum recta linea coniungens pun  
cta  $rb$  æqualis est rectæ lineæ, ipsa  $ms$  puncta 28. tertii.  
coniungenti: & ideo arcus  $rb$  arcui  $ms$  est æ  
qualis. Eadem quoque ratione æqualis ostende  
tur arcus  $tc$  ipsi  $nu$ . Itaque quoniam arcus  $ar$   
æqualis est arcui  $ls$ , &  $rb$  ipsi  $ms$ ; arcus  $ab$   
horæ Cancrī eadem quantitate superabit arcum  
 $ar$  horæ æquinoctialis, qua arcus  $ar$ , hoc est  $ls$   
arcum  $lm$  superat. ergo  $lm$  est arcus horæ pri  
mæ Capricorni. Sumatur arcui  $rb$  æqualis arcus  
 $tx$ , & ipsi  $sm$  æqualis  $uy$ . erit  $rt$ , hoc est  $ar$   
æqualis ipsi  $bx$ ; & eadem ratione  $su$ , hoc est  $ls$   
erit æqualis ipsi  $my$ . Sed cum  $ab$ , qui est æqua  
lis  $bc$ , excedat  $ar$ , excessu  $rb$ ; &  $bc$  excedat  $bx$   
æqualem ipsi  $ar$ , excessu  $xc$ : erit  $rb$ , hoc est  
 $tx$  ipsi  $xc$  æqualis. at  $ms$ , hoc est  $yu$  æqualis  
erat ipsi  $rb$ , hoc est ipsi  $tx$ ; &  $nu$  æqualis ipsi  
 $tc$ . quare & reliquus  $ny$  reliquo  $xc$  æqualis erit.  
sequitur igitur, ut arcus  $tx$ ,  $xc$ ,  $ny$ ,  $yu$  inter  
se sint æquales. Rursus quoniam arcus  $rt$ , hoc est  
 $bx$  æqualis est arcui  $su$ , hoc est  $my$ ; &  $bc$  ar  
cus horæ Cancrī superat  $bx$  arcum horæ æquino  
ctialis, ipso  $xc$ : arcus uero  $my$  superat arcum  
 $mn$ , ipso  $ny$ : erit  $mn$  arcus horæ secundæ Ca  
pricorni. Similiter demonstrabitur idem contin  
gere in aliis horis Capricorni, & in horis reliquo  
rum parallelorum. ergo circuli maximi, qui tran  
seunt




## DE HOROLOGIORVM

seunt per diuisiones Cancrī, & æquinoctialis, etiā  
per Capricorni, & aliorum parallelorum diuisiones  
transibunt. Ex quibus constat, circulos maxi-  
mos parallelos omnes in ipsis horarum diuisioni-  
bus secare. Hos autem circulos non inepte ho-  
rarios appellabimus, quemadmodum & rectæ li-  
neæ, quæ ipsorum, & plani horologii communes  
sectiones sunt, horariæ dicentur. Poterant hi  
tres paralleli, uidelicet parallelus Cancrī, Capri-  
corni, & æquinoctialis sufficere nobis ad horolo-  
gium eiusmodi describendum, nisi uelimus etiam  
umbras perferutari, quæ sunt in aliis parallelis.  
fatius tamē erit lineas ipsas ab extremitate umbræ  
gnomonis in plano factas designare; quæ sunt co-  
nicæ sectiones, siue hyperbolæ, siue parabolæ, si-  
ue ellipses, siue circuli pro uariis cæli ad subiectū  
planum inclinationibus, ut demonstrabitur. Nam  
cum sol quotidie ob motum primi cæli parallelum  
fere circulum efficiat, animo comprehendere de-  
bemus solis radium, ueluti rectam lineam ad cen-  
trum mundi pertinentem, atque ulterius produ-  
ctam, una cum sole semper ferri, quosque ad eum  
locum reuertatur, unde primum moueri cœpit.  
describet enim superficiem ex duabus superficie-  
bus constantem, quæ ad mundi centrum, tanquā  
ad uerticem inter sese iunguntur. earum altera lu-  
minis, altera umbræ superficies recte nuncupabi-  
tur. Itaque horologii planum superficiei umbræ  
occurrens, eam ueluti abrumpit, & uarias gignit  
sectiones,



DESCRIPTIONE. 57

sectiones, ut ex iis, quæ ab Apollonio demonstra-  
trata sunt, colligere possumus. data nanque in-  
clinatione cæli, gnomonisq; altitudine, & paral-  
lelo, in quo sol mouetur, facile nobis erit lineam  
ab umbræ extremitate in plano factam describere.



fit meridianus circulus, ut in superiori analemma  
te, a b c d; sitq; a c æquinoctialis dimeter; b d  
mundi axis; f k diameter paralleli Cancræ, cui ad-  
datur r s paralleli Capricorni diameter; o n dia-  
meter horizontis; & p q uerticalis. Sit autem  
P gnomon



## DE HOROLOGIORVM


gnomon e z rectus ad horologii planum, quod per lineam  $\phi\chi$  transit: & iungantur  $fs$ ,  $rk$ , quæ transibunt per centrum  $e$ , cum sint circulo rum maximorum diametri, ut ex septima secundi sphaericorum apparet: atque  $fs$  quidem secet lineam  $\phi\chi$  in  $t$ ,  $rk$  uero in  $u$ . at  $fk$  eandem in  $x$  secet,  $rs$  in  $y$ , &  $ac$  in  $\psi$ . Si ergo ponamus solem in Cancri parallelo conuerti, eius radius ad centrum mundi pertinens in conuersione describet superficiem conicam  $feK$ : gnomonis autem uerticis umbra ex contraria parte  $res$  superficiem describet. Rursus sole Capricorni parallelum permeante, describet eius radius superficiem  $res$ , & umbra uerticis gnomonis ipsam  $fek$ . Cum igitur conicas superficies ad uerticem coniunctas horologii planum  $\phi\chi$  nō per uerticē secet, erunt utræque sectiones hiperbolæ similes, & æquales, quæ oppositæ appellantur, ut constat ex quartadecima primi conicorum. Itaque si has sectiones in horologii plano apposite describere oporteat, sit in eo circulus, qualis in superiore figura  $abcd$ , cuius cētrū  $e$ , sitq;  $a$  c cōmunis sectio ipsius & uerticis,  $b$   $d$  ipsius & meridiani, quæ lineæ  $\phi\chi$  respondet:  $gf$   $h$  communis sectio eiusdem & æquinoctialis: sumaturq; in linea  $fb$  à puncto  $f$ , quod respondet puncto  $\psi$ , linea  $fr$  æqualis ipsi  $\psi t$ . et circa diametrum  $rb$  à uertice  $r$  describatur hyperbole æqualis ei, que est circa diametrum  $ty$ . hanc nos Cancri hyperbolen dicemus, quippe quam



DESCRIPTIONE.

58

quam extremitas umbræ gnomonis, sole in principio Cancrī existente designat. deinde ab eodē puncto f ex linea f d sumatur f s, æqualis ipsi ↓ u: & a uertice s describatur hyperbole Capricorni, qualis ea, quæ est circa u x diametrum. Eodem modo si ducatur diameter paralleli Gemino-



rum, uel Leonis, & ex altera parte diameter paralleli Sagittarii, uel Aquarii, iunganturq; eorum extrema lineis per mundi centrum transeuntibus, ostendemus sole eos parallelos percurrēte, superficies

P ii



## DE HOROLOGIORVM





ficies designari conicas; & ab horologii plano ita secari, ut sectiones oppositæ fiât; quas similiter in plano describemus: & simili ratione in aliis duobus parallelis. Hæ igitur sectiones in horologio designatæ terminos umbrarû uniuscuiusque horæ, & in quocunque parallelo perpulchre definiunt. Possumus etiam ad faciliorem horologiorum descriptionem his sectionibus uti. nanque primum in horologio siue ex circumferentia horizontali, siue ex longitudine umbræ, singularum horarum terminos in extremis hyperbolis Cancrî, & Capricorni inueniemus. deinde per eos ipsos ita, ut superius dictum est, horarias lineas ducemus.

Modus autem describendæ hyperbolæ & ellipsis ex 21 primi conicorum elicitur, quemadmodum & modus parabolæ describendæ ex 20 eiusdem, ut his locis admonet Eutocius Ascalonita. Albertus Durerius in libris, quos conscripsit de institutionibus Geometricis, alios modos tradit. attamen una, eademq; ratio in omnes sectiones conuenire potest. Sit enim conus  $abc$ , & secetur plano per axem, quod sectionem faciat triangulum  $abc$ : secetur autem & aliis planis, ita ut fiant sectiones parabolæ, hyperbolæ, & ellipsis, quarum diameter  $de$ : atque oporteat eas in plano describere. Sumantur in ipsa  $de$  quotcumque uouerimus puncta  $fgh$ ; per quæ ducantur rectæ lineæ, basi trianguli per axem æquidistantes usque ad eius latera,  $kfl$ ,  $mgn$ ,  $ohp$ , & inter lineas  $kf$ ,  
fl



DESCRIPTIONE. 59

f l sumpta media proportionali f q: atque inter  
lineas m g, g n sumpta proportionali g r; & inter  
o h, h p ipsa h s, eas ad diametrum cuiusque se-  
ctionis seorsum aptabimus, ita ut rectum angulū  
contineāt: & ulterius producentes ex altera dia-  
metri parte ipsis æquales sumemus ft, g u, h x.







# DE HOROLOGIORVM

Dico puncta qrs, & tu  
x in sectionem cadere. du  
cto enim plano per kl  
basi æquidistante, sectio  
circulus erit: cuius qui  
dem & plani secantis cõ  
munis sectio sit fy. Cum  
igitur circulus Kyl, &  
coni basis æquidistent,  
atque eodẽ plano secen  
tur; erunt & communes  
sectiones ipsorum æqui  
distantes. Sed commu  
nis sectio basis perpendi  
cularis est ad lineam bc,  
quod patet ex 11, 12, &  
13 primi conicorũ. ergo  
& y f ad Kl perpẽdica  
ris erit: idcircoq; inter li  
neas Kf, fl proportio  
nalis. ex quibus colligitur fy, fq inter se æquales  
esse. cadit autẽ punctum y in sectionẽ. ergo & q in  
sectionem cadet. similiter demõstrabimus puncta  
rs esse in sectione, quare & t u x in ipsa sectione e  
runt. si igitur lineam duxerimus, quæ omnia iam  
dicta puncta apposite coniungat, descriptæ erunt  
ipsæ sectiones parabole, hyperbole, & ellipsis.  
quod facere oportebat. Itaque sole æquinoctia  
lem parallelum percurrẽte gnomonis uerticis um  
bra

16. undeci  
mi.


10. undeci  
mi.





DESCRIPTIONE. 60

bra in horologii plano rectā ubique lineā descri-  
bit, quæ ipsius & æquinoctialis cōmunis sectio est,  
In aliis uero parallelis, quos horizonis planum  
secat, describit hyperbolen, ita ut in iis, quæ op-  
ponuntur, sectiones oppositæ fiant, quod supra de  
monstrauimus. At ubi planum horizonis contin



git parallelum, parabolē efficit: alioqui uel elli-  
psim, uel circulū: circulū quidē si planum parallelo  
æquidistat, sin minus ellipsim. Sit meridianus cir-  
culus a b c d, in quo alia omnia maneant, ut in su-  
perioribus: horizon uero à polo arctico tantum  
distare



## DE HOROLOGIORVM

6. secundi  
sphaericorū


19. undeci  
mi.

distare ponatur, quantum ipse Cancrī parallelus ab eodem distat. continget planum horizontis Cācri parallelū, quare & oppositum ipsius, hoc est parallelū Capricorni continget. Sed ille extabit totus supra terrā; hic uero totus sub terra occultabitur. trāsit ergo horizon per lineā  $rK$ , & horologii planum per  $\phi\chi$  ipsi æquidistantem. At cum planum paralleli  $rs$ , & planum per  $\phi\chi$  utraque ad meridianum recta sint, & communis ipsorum sectio ad eundem recta erit. quare et ad lineam  $rs$ , quæ est in eo plano, atque ipsam contingit. Quoniam igitur conus  $res$  secatur plano per axem ducto, secatur autem & altero plano  $\phi\chi$ , quod basim coni secat per rectam lineā, perpendicularē ad basim trianguli per axem; & diameter sectionis  $ty$  ipsi  $er$  lateri trianguli æquidistat: sectio erit parabole ex undecima primi conicorum. ergo sole in parallelo Cācri existente, quē horizon contingit, umbra uerticis gnomonis efficiet in plano parabolē. at in aliis parallelis, qui deinceps sunt, sectiones oppositas, quoniam omnes ab ipso horizontis plano secantur. Sit rursus meridianus circulus una cum aliis, quæ dicta sunt: & horizon à polo tantum distet, quantum parallelus per Geminos & Leonem, cuius diameter  $tu$ . Sit autem diameter paralleli per Sagittarium & Aquarium  $hm$ . horizon ergo per lineam  $hu$  transiēs tangit parallelos  $tu$ ,  $hm$ . quare dum sol in parallelo  $tu$  conuertitur, per ea, quæ superius demon-



DESCRIPTIONE. 61

demonstrata sunt, extremitas umbræ gnomonis  
in plano parabolæ describit; in parallelo autem  
f K ellipsim ex 13 primi conicorum, quia conus  
r e s tunc plano per axem ducto secatur; secaturq;  
altero plano, quod productum coibit cum utro-  
que latere trianguli per axem, neque basi æquidi




stante, neque subcontrarie posito: & communis  
sectio plani secantis, & eius, in quo basis coni,  
ad basim trianguli per axem est perpendicularis.  
Ea autem omnia ex iis, quæ proxime dicta sunt,  
facilem

Q



# DE HOROLOGIORVM

facilem demonstrationem habent. Sit denique meridianus circulus, in quo horizontis diameter eadem sit, quæ æquinoctialis a c. In quocunque igitur parallelo existat sol, eorū qui sunt supra terram, conus secabitur plano per  $\phi\chi$ , basi eius æqui distante. quare ex quarta primi conicorum sectio




semper circulus erit. In æquinoctiis uero umbra in planū non cadet, quòd æquinoctialis planum, & planum horologii æquidistantia nullo pacto se secant. ergo ubi horizon parallelo æquidistat, uerticis gnomonis umbra in plano describit circulum :



# DESCRIPTIONE.

62

lum : ubi non æquidistat, ellipsum : quæ omnia de  
monstrasse oportebat. Hæc eadem in uerticulis,  
& meridiani plano similiter demonstrari possunt,  
quoniam & uerticulis & meridiani horizontes  
quidam sunt. Eodem modo si sumantur circunfe-



rentiæ descensuæ, & horizontales singularū hora-  
rum ex propriis cuiusque diuisionibus : & alia ho-  
rologia conficiemus . ut in astronomicis , sit pri-  
mæ & undecimæ horæ Cancrī descensua circunfe-  
rentia p α , horizontalis p β ; secundæ & decimæ

Q ii de-




## DE HOROLOGIORVM

descensua  $p\gamma$ , horizontalis  $p\delta$ ; tertiæ ac nonæ  
 descensua  $p\varepsilon$ , horizontalis  $p\zeta$ ; quartæ & octa-  
 uæ descensua  $p\eta$ , horizontalis  $p\theta$ ; quintæ ac septi-  
 mæ  $p\iota$ ,  $p\kappa$ , sextæ utriusque, postmeridianæ sci-  
 licet, & antemeridianæ  $p\lambda$ ,  $p\mu$ ; septimæ, ac  
 quintæ  $p\nu$ ,  $p\xi$ . Primæ uero, ac undecimæ horæ  
 Capricorni descensua circumferentia sit  $q\phi$ , ho-  
 rizontalis  $q\pi$ ; secundæ ac decimæ  $q\rho$ ,  $q\sigma$ ; ter-  
 tiæ ac nonæ  $q\tau$ ,  $q\nu$ ; quartæ & octauæ  $q\omega$ ,  $q9$ :  
 & describatur rursus circulus  $abcd$ , æqualis  
 meridiano, cuius centrum  $e$ : ductisq; diametris  
 $acd$ , ut in aliis, & ducta linea  $gh$  æquidistan-  
 te ipsi  $ac$ , ex interuallo  $\zeta\psi$ , quam nos æquinoctia-  
 lis lineam supra appellauimus; sumantur à pun-  
 ctis  $a$   $c$  ad partes  $b$  circumferentiæ  $a\iota$ ,  $c\kappa$ , æqua-  
 les ipsi  $p\beta$ , quoniam circumferentia horizonta-  
 lis horæ quidem primæ Cancrī à terminō uertica-  
 lis occidentali, undecimæ uero à terminō orien-  
 tali ad meridiem declinat: & per puncta  $\iota$ ,  $\kappa$ , &  
 centrum  $e$  ducatur lineæ occultæ  $\iota el$ ,  $\kappa em$ ; dein-  
 de in linea  $el$  sumatur  $en$ , & in linea  $em$  ipsa  
 $eo$ , quæ sint æquales lōgitudini umbræ dictarum  
 horarum. erit punctum  $n$  terminus umbræ in ho-  
 ra prima Cancrī, &  $o$  terminus in undecima.  
 non aliter in secunda & decima; tertia & nona;  
 quarta & octaua, & aliis, umbrarum terminos in-  
 ueniemus. in quinta tamen, septima, & reliquis su-  
 mentur circumferentiæ ab  $a$   $c$  ad partes  $d$ , quoniā  
 puncta  $\kappa\mu\xi$  à uerticali ad septentrionē declinant.  
 At



# DESCRIPTIONE. 63

At in horis Capricorni cū pūcta  $\pi\sigma\upsilon\theta$  uergāt ad meridiem, & circumferentiā omnes horizontales ex parte b accipientur. terminos autem horæ septimæ, ac quintæ Cancrī idcirco nō apposuimus, quōd earum umbræ longius excurrentes in tā angusto loco excipi minime potuerunt. Postremo




terminos primæ & undecimæ horæ Cancrī, cum terminis primæ & undecimæ Capricorni coniūgemus, & ita in ceteris: quæ lineæ & earundem horarum terminos cōiungent in aliis parallelis, cum sint



## DE HOROLOGIORVM

sint communes sectiones plani horologii, & maximorum circularum, qui per polos æquinoctialis, & reliquorum parallelorum incedentes, eos in ipsis horarum diuisionibus secant. ut ex decima secundi sphæricorum apparet. In Italicis uero horologiis, postquam eadem uia inuenerimus ter

*de Italicis horologiis*




minos omnium horarum Cancrī, Capricorni, & Arietis, uel Libræ, terminum uigesimæ tertiæ horæ Cancrī cum termino uigesimæ tertiæ Capricorni: & terminum uigesimæ secundæ Cancrī cum termino uigesimæ secundæ Capricorni ductis lineis, copulabi-



DESCRIPTIONE. 64

copulabimus. & eodē modo in aliis usque ad sextā  
decimam horam: quæ lineæ & per alios earundem  
horarum terminos ducentur. sunt enim commu-  
nes sectiones plani eius, & maximorum circulo-  
rum, qui cum parallelorum semper apparentium




maximum contingant, & per diuisiones horarum  
in omnibus parallelis, ex tertia decima secūdi sphæ-  
ricorum transibunt; quod etiam supra demonstra-  
tum est. terminos uero tertiæ decimæ horæ Can-  
cri, & Arietis; itemq; quartæ decimæ, & quintæ  
decimæ



## DE HOROLOGIORVM

decimæ terminos inter sese connectemus ; lineas ipsas quoad libuerit producentes , quoniam ex altera parte terminos præfinitos non habent . Postea decimæ, undecimæ & duodecimæ horæ Cancrî terminos iungentes cum terminis earundem horarum, sole Geminos , uel Leonem tenente ; qui ad hoc



dumtaxat inueniantur, reliquas horologii lineas, & denique horologium ipsum absoluemus . Babylonica horologia eisdem prope rationibus efficiemus : non enim ab Italicis differunt, nisi ordine tantum.



tum . nam quæ postrema in his ex parte orientis uigesimalam tertiam indicat horam , translata ad occidentem in illis primam horam indicabit : & quæ in his uigesimalam secundam, itidem transposita in illis secundam horam ostendet : et ita deinceps, ut in propria figura apparebit .

### De horologiis uerticalibus .


At horologium , quod in uerticali plano describitur , duas alias circumferentias requirit , horarias scilicet & uerticales : horariæ enim solis altitudinem supra dictum planum, uerticales eiusdem distantiam uerticalem, seu latitudinem declarant . unde umbrarum longitudo, latitudoq; præfinitur . Ex his igitur circumferentiis , quemadmodum supra docuimus , in uno quoque horologiorum genere sumptis , horarias lineas ducemus : quæ simili liter plani eius , & maximorum circulorum communes sectiones demonstrabuntur . Sed ut illud exemplo planius fiat , sit in horologio antiquorum primæ , & undecimæ horæ Cancræ circumferentia horaria  $n\alpha$  , uerticalis  $p\beta$  ; secundæ & decimæ horaria  $n\gamma$  , uerticalis  $p\delta$  ; tertiæ ac nonæ horaria  $o\epsilon$  , uerticalis  $p\zeta$  ; quartæ & octauæ  $o\eta$  ,  $p\theta$  ; quintæ ac septimæ  $o\iota$  ,  $p\kappa$  . Primæ uero ac undecimæ Capricorni horaria circumferentia sit  $n\lambda$  , uerticalis  $q\mu$  ; secundæ ac decimæ horaria  $n\nu$  , uerticalis  $q\xi$  ; tertiæ ac nonæ  $n\omicron$  ,  $q\pi$  ; quartæ & octauæ  $n\rho$  ,  $q\sigma$  ; quintæ ac septimæ  $n\tau$  ,  $q\upsilon$  . Con-

R stituatur



## DE HOROLOGIORVM

stituatur rursus gnomonis altitudo, cui æqualē, sumemus ex utraque parte pūcti e in linea o n : sitq; e z ex parte n, e φ ex parte o: & per z φ ipsi p q æquidistantes lineas ducemus, ita ut quæ transit per z diametrum æquinoctialis secet in ↓. erit z ↓ longitudo



gitudō umbræ meridianæ in æquinoctiis. Quòd si per α, qui est finis circumferentiæ horariæ, & per centrum e ducatur linea usque ad æquidistāte per φ in χ; rursus φ χ erit longitudo umbræ in prima, & undecima hora Cancrī. eodem modo & in aliis horis umbrarum longitudes inueniētur. Itaque quoniam




quoniam circulus uerticalis, cuius diameter  $p q$ , septentrionale hemisphæriū separat à meridiano, suntq; horæ primæ & undecimæ; secundæ, ac decimæ Cancrī diuisiones in parte septentrionali: earum horarum lineas in uerticalis plano, quod ad septentrionem spectat, reliquas in eo, quod ad meridiem describere oportebit. Quare si horas omnes obseruare uelimus, duo horologia uerticalia construenda erunt: septentrionale alterum, alterum meridianum. quod ut commode fiat, sumatur primæ, ac undecimæ horæ Geminorum, uel Leonis circumferentia horaria  $o r$ , & uerticalis  $q s$ ; secundæ ac decimæ horaria  $o t$ , uerticalis  $q u$ : sumatur deinde primæ ac undecimæ Arietis uerticalis circumferentia  $p x$ ; secundæ ac decimæ  $p y$ ; tertiæ ac nonæ  $p \omega$ : quæ ad hoc in præsentia satis erunt. Et primum intelligatur in plano, quod per  $\phi \chi$  transit, ipsi uerticali circulo æquidistante, & in parte eius septentrionali circulus  $a b c d$ , descriptus ex centro  $e$ , & æqualis meridiano cum diametris  $a c$ ,  $b d$  ad rectos angulos sese secantibus: quarum  $a c$  sit ipsius plani, & horizontis communis sectio,  $b d$  uero communis sectio eiusdem, & meridiani: ita ut  $a$  ad orientem ponatur;  $c$  ad occidentem;  $d$  ad punctum, quod est secundum uerticem, arabes Zenit uocant;  $b$  ad punctum è regione oppositum. Quoniam igitur circumferentia uerticalis horæ primæ Cancrī  $p \beta$  à uerticali puncto ad orientem uergit, & undecimæ ad occidentem,

R ii accipiatur



## DE HOROLOGIORVM

accipiatuſ à puncto d ad partes a circunferentia d i  
& ad partes c circunferentia d k, quæ ſint æqua-  
les ipſi p β circunferentiæ: perque i k puncta, &  
centrum e ductis lineis i e l, k e m, à linea e l  
abſcindatur e n, & à linea e m ipſa e o, æquales  
longitudini umbræ dictarum horarum: erit pun-




ctum n terminus horæ primæ Cancrī, & o termi-  
nus undecimæ. ſimili ratione inueniantur termini  
primæ & undecimæ horæ Geminorum, uel Leo-  
nis. quæ igitur hos terminos iungunt, erunt lineæ  
horariæ primæ, ac undecimæ horæ: & ita ducen-  
tur



DESCRIPTIONE.

67

tur lineæ horariæ secundæ & decimæ. ex quibus quattuor lineis constat horologium uerticale, quod ad septentrionem spectat. Intelligatur rursus in plano, quod per  $z \downarrow$  transit, similiter uerticali circulo æquidistante, & in parte ipsius meri




diana circulus  $a b c d$  descriptus, cuius centrum  $e$ , & diametri  $a c$ ,  $b d$ ; ita tamen, ut  $a$  ad occidentem constituatur, &  $c$  ad orientem: deinde in linea  $e b$  sumatur æqualis ipsi  $z \downarrow$ , per cuius terminum linea ipsi  $a c$  æquidistans ducatur. erit ea cōmunis



## DE HOROLOGIORVM

munis sectio æquinoctialis, & plani horologii, qua  
horarum æquinoctialium umbra terminabuntur.  
Itaque a puncto d ad partes c accipiantur circunfe  
rætiæ uerticales in horis antemeridianis, & ad par  
tes a in postmeridianis, atque in iis, quæ oppo



nuntur quartis inueniantur termini horarū omniū  
Capricorni : tertiæ uero & nonæ ; quartæ & octa  
uæ ; quintæ ac septimæ Cancrī : & præter hos pri  
mæ ac undecimæ ; secundæ & decimæ ; tertiæ &  
nonæ Arietis . postea terminos primæ ac undeci  
mæ Capricorni cum terminis primæ, ac undeci  
mæ ;




DESCRIPTIONE. 68

mae Arietis : & terminos secundae ac decimae Capricorni cum terminis secundae ac decimae Arietis iungentes, lineas ulterius quoad libuerit producemus. terminos uero tertiae ac nonae Capricorni cum terminis earundem Cancris, si recipientur in plano, in quo horologium describimus, non longius protendi necesse est, sin minus, eos iungemus cum terminis tertiae, ac nonae Arietis. postremo terminos reliquarum horarum Capricorni, & Cancris inter sese copulantes, horologium ipsum, quod ad meridiem spectat perficiemus. Licet etiam septentrionale horologium, de quo ante dictum est, meridiani auxilio facile describere, productis nimirum primae, ac undecimae; secundae ac decimae horae lineis; & producta hyperbola, quae horarum Capricorni terminos inter sese coniungit: namque prima horologii septentrionalis hora ex prima meridiani, & secunda item ex secunda ortum habet, & reliquae eodem modo; quod in subiectis figuris apparere potest: ita tamen, ut huiusmodi horologium ex altera uerticis parte descriptum intelligatur, in qua ea, quae nunc dextra, sinistra, & quae sinistra, dextra euadunt. Illud autem idcirco contingere perspicuum est, quod termini cuiuslibet horae Cancris, & Capricorni sunt in eadem recta linea, uidelicet in communi sectione plani horologii & circuli maximi, qui per diuisiones ipsorum parallelorum transit. Eodem ordine & alia horologia uerticalia efficiemus, ne idem saepius iteretur, ducentes lineas  
horarum



# DE HOROLOGIORVM



horarum, quæ sunt ad septentrionem in horologio septentrionali; quæ uero ad meridiem in meri-





# DESCRIPTIONE. 69

diano. quorū omnium figuræ inferius exponūtur.




S



## DE HOROLOGIORVM

### De horologiis meridianis .

Horologium in meridiani plano descriptum ,  
quemadmodum & ipsum uerticale, duplex est, al-  
terum ad orientem solem, alterum ad occidentem  
spectans ; quod ex reliquis duabus circumferentiis



efficitur ; hectemoriis , & meridianis . hectemoriæ  
enim solis altitudinem supra dictum planum , me-  
ridianæ ipsius distantiam meridianam, seu latitudi-  
nem ostendunt , ex quibus umbrarum gnomonis  
rationes percipiuntur. Sit igitur in horologio iuxta  
anti-



DESCRIPTIONE. 70


antiquorum diuisionem primæ & undecimæ horæ Canceri circumferentia hectemoria p α, meridiana n ε; secundæ ac decimæ hectemoria p γ, meridiana n δ; tertiæ ac nonæ hectemoria p ε, meridiana o ζ; quartæ & octauæ p η, o θ; quintæ & septimæ p ι, o κ. Primæ rursus, ac undecimæ Capricorni circumferentia hectemoria sit o λ, meridiana n μ; secundæ, ac decimæ hectemoria o ν, meridiana n ξ; tertiæ ac nonæ o ο, n π; quartæ ac octauæ o ρ, n σ; quintæ ac septimæ o τ, n υ. gnomonis autem altitudo sit e z, sumpta in linea e q: & per punctum z ipsi o n æquidistans agatur φ χ. quare ductis lineis per circumferentiarum hectemoriarum fines, & per centrum e usque ad lineam φ χ, uel ad eam, quæ ex altera parte o n ducta fuerit, instar ipsius φ χ; longitudines umbrarum in horis Canceri, & Capricorni deprehendentur. Itaque in plano, quod plano meridiani sit parallelum, ab eoq; tantum distet ad occidentem, quanta est gnomonis altitudo, in parte tamen eius orientali, describatur circulus a b c d ex centro e cum diametris a c, b d; ita ut a c quidem sit ipsius, & horizontis communis sectio: b d uero cōmunis sectio ipsius, uerticisq;: & punctū a ad meridiē, c ad septentrionē uergat. Postea ducatur alia diameter f g ipsius plani, & æquinoctialis cōmunis sectio, in qua æquinoctiorum umbræ terminabuntur. cum enim gnomon rectus in centro e statuatur, non recedet ab æquinoctialis plano. quare neque ipsius um-

S i i bræ



# DE HOROLOGIORVM

bræ a linea fg declinabunt. deinde a puncto c ad partes d sumpta circumferentia ch, quæ sit æqualis ipsi n β; & per h e ducta linea occulta h e i, ab ipsa e i abscindatur æqualis lōgitudini umbræ in prima hora. erit eius lineæ terminus & termi-



nus horæ primæ Cancrī. eodem quoque modo aliarum horarum termini inuenientur. iunctis igitur primæ horæ, itemq; secundæ, & aliarum ante-meridianarum Cancrī & Capricorni inter sese terminis, efficietur horologiū meridianum ad orientem




# DESCRIPTIONE.

71

tem spectans quod uero spectat ad occidentem ex  
contraria parte similiter describetur. & eadem ra-  
tio erit aliorum huiusmodi horologiorum, quo-  
rum etiam formas expressimus.


## HOROLOGIVM ANTIQVVM AD OCCIDENTEM.





# DE HOROLOGIQRVM


HOROLOGIVM ASTRONOMICVM  
AD ORIENTEM.





DESCRIPTIONE. 72


HOROLOGIVM ASTRONOMICVM  
AD OCCIDENTEM.





# DE HOROLOGIORVM


MYCIMOHOXTA MYIDIOLOE  
HOROLOGIVM ITALICVM  
AD ORIENTEM.





DESCRIPTIONE. 73

HOROLOGIVM ITALICVM  
AD OCCIDENTEM.






# DE HOROLOGIORVM

## De horologiis æquinoctialibus.

Horologia autem in plano æquinoctialis perfacile, & nullo negotio efficientur. Quoniam enim declaratum est, ubi planum illud pro horizonte habetur, circulos semper a gnomonis uertice de-




scribi: inuenientur longitudines umbrarum sole existente in singulis parallelis, quæ erunt semidiametri ipsorum circulorum. Sit meridianus circulus  $a b c d$  cum diametris  $a c, b d$ , quæ sese ad rectos angulos secant: & referat  $a c$  diametrum æqui-



# DESCRIPTIONE. 74

æquinoctialis. deinde ex parte septentrionali d  
aliorum parallelorum diametri omnes, quales in  
analemmate ducantur; f k quidem diameter Can  
cri, & Capricorni; h m Geminorum, & Sagitta  
rii; g l uero Tauri, & Virginis: sumaturq; e z æ-




qualis altitudini gnomonis: & per z ipsi a c æqui  
distans agatur  $\phi\chi$ . ductis igitur per puncta fg h,  
& centrum e lineis usque ad ipsam  $\phi\chi$ , uidelicet  
f e r, h e s, g e t, erit z r umbræ longitudo, dum  
sol in parallelo Cancrī & Capricorni uersatur: z s

T ii in



# DEHOROLOGIORVM

in parallelo Geminorum, & Sagittarii: z t in eo, qui est Tauri, & Virginis. Intelligentur in plano per  $\phi\chi$ , quod æquinoctiali æquidistat, ex centro e, & interuallis z r, z s, z t circuli tres,  $\alpha\epsilon\gamma\delta$ ,  $\zeta\eta\theta\kappa$ ,  $\lambda\mu\nu\xi$  à tribus iam dictis parallelis descripti, quorum minor  $\alpha\epsilon\gamma\delta$  diuidatur in duas por-




tionem inæquales, ita ut maior portio  $\alpha\delta\gamma$  Canceri portioni, minor  $\alpha\beta\gamma$  portioni Capricorni respondeat. et ducta linea a  $\gamma$  utrinque producat, secans circulum  $\zeta\eta\theta\kappa$  in punctis  $\zeta\theta$ ; circulum uero  $\lambda\mu\nu\xi$  in  $\lambda\nu$ . ergo linea  $\lambda\nu$  erit communis sectio eius



# DESCRIPTIONE. 75

eius plani & horizontis . Itaque in horologiis anti-  
quis cuiuslibet circuli circumferentiæ, quæ sunt in  
alterutra portione , æqualiter diuidantur in duo-  
decim partes, & diuisionum puncta lineis iungan-  
tur . In astronomicis uero circumferentiæ diui-  
dantur in partes horarum æquinoctialium , facto



initio à linea meridiana, hoc est ab ipsa  $\mu\xi$ . sed in  
Italicis ordiemur diuisiones à communi sectione  
ipsius plani , & hori zontis : atque in omnibus li-  
neas horarias ducemus , ut in subiectis figuris ap-  
parebit . Quòd si quis horas etiam ante , uel post  
æqui-



## DE HOROLOGIORVM

æquinoctia obseruare uoluerit, lineas ulterius producat necesse est: nanque in ipsis æquinoctiis, uti diximus, umbræ in planum non cadunt. Erunt autem & in his duo horologia; unum, quod ad polum arcticum spectat, & continetur in portione  $\lambda\xi$ , septentrionalibus signis inseruiens: alterum, quod ad oppositum in portione  $\lambda\mu\nu$ , inseruiens australibus: ita tamen, ut in utrisque gnomon centro e affigatur.


### De horizontalibus inclinatis.

Horologia, quæ in planis ad horizontem inclinatis fiunt, horizontalia inclinata appellare libuit. huiusmodi uero plana uel ad meridianum recta sunt, uel inclinata. Ut igitur à facilioribus exordiamur, uidelicet ab iis, quæ in plano ad meridianum quidem recto, ad horizontem autem inclinato efficiuntur, sit meridianus circulus  $a b c d$  circa centrum  $e$ , cuius diameter  $a c$  sit ipsius & horizontis Romæ communis sectio:  $b d$  communis sectio ipsius, uerticisq;: & ducantur diametri parallelorum cum suis diuisionibus, ut in analemma te. rursus meridiani, & horizontis inclinati sit  $o n$  communis sectio, quam ad rectos angulos diuidat alia diameter  $p q$ . Itaque inueniantur circumferentiæ descensuæ & horizontales singularū horarum ad horizontem  $o n$ : ut in horologio antiquorum circumferentia descensiuæ tertiæ, ac nonæ horæ Cancrī sit  $p \alpha$ , horizontalis  $p \beta$ : quoniam  
in



DESCRIPTIONE. 76

in prima & undecima; secunda & decima hora supra horizontem ex parte p gnomonis umbræ non cadunt; sed ex parte opposita. quartæ & octauæ circunferentia descensua fit p  $\gamma$ , horizontalis p  $\delta$ ; quintæ ac septimæ descensua p  $\epsilon$ , horizontalis p  $\zeta$ . pri




mæ uero, ac undecimæ Capricorni descensua circunferentia fit q  $\eta$ , horizontalis q  $\theta$ ; secundæ ac decimæ descensua q  $\iota$ , horizontalis q  $\kappa$ ; tertiarum ac nonarum q  $\lambda$ , q  $\mu$ ; quartæ & octauæ q  $\nu$ , q  $\xi$ ; quintæ & septimæ q  $\omicron$ , q  $\pi$ : Quòd si horologium ex altera etiam



## DE HOROLOGIORVM

etiam horizontis parte, quæ spectat ad q describe  
re oporteat, accipiantur circunferentiæ descen-  
siuæ & horizontales primæ & undecimæ; secundæ &  
decimæ horæ Cancrī: sitq; primæ & undecimæ de-  
scensiuæ circunferētia q ρ, horizontālis q σ; secūda  
& decimæ descensiuæ q τ, horizontalis q υ. deinde



sumpta ez, quæ sit gnomonis altitudini æqualis :  
per z ducatur φχ ipsi o n æquidistans, secansq;  
diametrum æquinoctialis in ↓ : & postremo ex iis,  
quæ superius dicta sunt, horologia describantur.  
Eadem ratione & alia eiusmodi non solum anti-  
qua




# DESCRIPTIONE.

77

qua, sed & astronomica, & Italica horologia efficiemus, quorum omnium figuras oculis subiecimus.

## HOROLOGIVM ASTRONOMICVM




V



# DE HOROLOGIORVM

## HOROLOGIVM ITALICVM



Nunc ad ea horologia accedamus, quæ in plano non solum ad horizontem, sed & ad meridianum inclinato fiunt: sed prius nonnulla demonstrare necessarium est.

Si



Si à circumferentia circuli super aliquod planum inclinati, perpendiculares ad idem planum ducantur, cadent omnes in lineam, quæ ellipsis appellatur: cuius quidem diameter maior determinatur circuli diametro, quæ communis sectio est ipsius, & dati plani, uel plano dato æquidistantis: minor uero determinatur interuallo perpendicularem, cadentiū ab extremitate alterius diametri, quæ priorem diametrum ad rectos angulos diuidit.

Sit circulus  $abcd$  circa centrum  $e$  ad aliquod planum inclinatus. uel igitur planum secat circum, uel non secat. secet primum, atque in centro  $e$ . erit ipsorum communis sectio circuli diameter, quæ sit  $ac$ : ducaturq; alia diameter circuli  $bd$ , secans ipsam  $ac$  ad rectos angulos, & à punctis  $b$   $d$  perpendiculares ad planum ducantur, quæ sint  $bf$ ,  $dg$ . sumpto autem alio quouis puncto  $h$  in circuli circumferentia, ab eo ad idem planum perpendicularis demittatur  $hk$ : & iungatur  $fg$ . Dico punctum  $k$  cadere in ellipsim, cuius quidem diameter maior est linea  $ac$ , eadem, quæ circuli diameter; & minor  $fg$ . Ducatur a puncto  $k$  perpendicularis ad  $ac$  diametrum, quæ sit  $kl$ ; est autem &  $fg$  perpendicularis ad eandem, & transit

V ii per




## DEHOROLOGIORVM

per centrum e: quoniam cum planum, quod per  
 18. undeci  
 mi. lineas b f, b d ducitur, rectum sit ad planum se-  
 cans circulum a b c d, quorum communis sectio  
 est f e g recta linea: erit a c ad f g perpendicu-  
 28. primi. laris. quare æquidistant inter sese f e, k l. sed &  
 6. undeci -  
 mi. ipsæ b f, h K æquidistant, cum sint perpendicu-  
 15. undeci  
 mi. lares ad idem planum. ergo planum, quod ducitur  
 16. undeci  
 mi. per lineas h K, K l, æquidistabit plano per b f,  
 f e ducto. & propterea ipsorum planorum ac cir-  
 culi a b c d communes sectiones h l, b e, æquidi-  
 stantes erunt. Itaque quoniam rectæ lineæ K l, l h,  
 sese tangentes, rectis lineis sese tangentibus f e, e b  
 10. undeci  
 mi. æquidistantes, non sunt in eodem plano: angulus  
 K l h angulo f e b æqualis erit. recti autem sunt  
 qui ad k, & f anguli. ergo & reliquus reliquo æqua-  
 4. sexti. lis: & triangulum triangulo simile. quare ut b e  
 ad e f, ita h l ad l K: permutandoq; ut b e ad h l,  
 22. sexti. ita f e ad K l: & ut quadratum b c ad quadratum  
 h l, ita quadratum f e ad ipsum k l quadratum.  
 ut autem quadratum b e ad quadratum h l, ita re-  
 ctangulum c e a ad rectangulum c l a, ex uigesima  
 prima primi conicorum. quadratum igitur f e ad  
 quadratum K l est, ut rectangulum c e a ad rectan-  
 gulum c l a. ergo ex eadem uigesima prima primi  
 conicorum, punctum K in ellipsi erit, cuius maior  
 diameter a c, & minor f g. Eodem modo ostende-  
 tur & aliud punctum, in quod à circumferentia cir-  
 culi perpendicularis cadit, in eadem ellipsi esse.  
 Si uero planum uel alibi, uel nullo modo circu-  
 lum



lum secet, ducto rursus alio plano ipsi æquidistan-  
te, quod eundem secet in centro; similiter demon-  
strabimus, perpendiculares ab ipsius circunferen-  
tia ad planum demissas, in ellipsim cadere. quæ  
quidem lineæ cum  
ulterius productæ  
ad aliud planum æ-  
quidistans, eandē  
positionē habeant:  
cadent & eo loco  
in ellipsim, cuius  
maior diameter æ-  
qualis erit diame-  
tro circuli, minor  
uero æqualis inter-  
uallo perpendicu-  
larium, quæ ab extre-  
mitatibus minoris  
diametri ducuntur.  
Constat ergo uerum esse illud, quod demonstan-  
dum proponebamus.



In circunferentia circuli ad aliquod pla-  
num inclinati sumptis quibuslibet pun-  
ctis, quo loco perpendiculares ab his ductæ  
in planum cadant, inuenire.

Sit circulus  $abc d$  circa centrum  $e$ , ad datum  
planū, in quo  $mn$  inclinatus: sumaturq; in circun-  
ferentia eius quod uis punctum  $h$ : & oporteat quo-  
loco




## DE HOROLOGIORVM

loco perpendicularis  $ab h$  ducta in planum  $m n$  cadat, inuenire. Ducatur planum aliud æquidistans plano  $m n$ , quod circulum  $abcd$  in centro  $e$  secet: sitq; eorum communis sectio diameter  $ac$ , cui ad rectos angulos alia diameter  $bd$  ducatur: & à punctis  $a c b d$  ad planum  $m n$  perpendiculares cadant,  $ao, cp, bq, dr$ : iunganturq;  $op, qr$ . erit recta linea  $op$  communis sectio plani eius, quod per lineas  $ac, cp$  ducitur, & plani, in quo  $m n$ ; maiorq; diameter ellipsis: &  $qr$  communis sectio eiusdem, & plani transeuntis per lineas  $bd, bq$ , ac minor ellipsis diameter. quæ duæ diametri sese bifariã & ad rectos angulos secabunt. Secent autem in  $s$ . Itaque ex centro  $s$  & interuallo  $so$  circulus describatur  $omp n$ , ita ut secet  $qr$  utrinque productam in punctis  $m n$ . rursusq; ex eodem centro, & interuallo  $sq$  describatur alter circulus  $tqur$ , qui ipsam  $op$  in punctis  $tu$  secet. deinde in circulo  $omp n$  sumatur à puncto  $m$  ad partes  $p$  circunferentia  $mx$ , æqualis circunferentiæ  $bh$  circuli  $abcd$ : & iungatur  $sx$  linea, quæ secet circulum  $tqur$  in  $y$ : à punctis autem  $xy$  ducantur perpendiculares  $xz$  ad  $sp$ ; &  $y\phi$  ad  $qs$ ; quæ quidem protracta ex parte  $y$  secet  $xz$  in  $\chi$ . Dico perpendicularem, quæ à puncto  $h$  ad planum  $m n$  ducitur, cadere in  $\chi$ . Nam ipsam quidem cadere in aliquod punctum lineæ  $xz$  perspicuum est. ducto enim per  $h$  plano æquidistante plano per  $bd, bq$ , quod secet diametrum



## 80




cularis, quæ ab  $l$  ducitur, cadit in  $z$ ; quoniam  
cum



DE HOROLOGIORVM

cum circulorum æqualium circumferentiæ  $b h$ ,  
 $m x$  sint æquales, & reliquæ  $h c$ ,  $x p$  æquales e-



29<sup>o</sup>tertiū. runt : & idcirco sinus  $h l$  æqualis sinui  $x z$ . æquales  
autem



autem rectæ lineæ æqualiter à centro distant . ergo 14. tertii.  
 e l æqualis est ipsi s z , & reliqua l c reliquæ z p . ex  
 quibus sequitur lineam x z communem esse eo-  
 rum planorum sectionem , in quam perpendicu-  
 laris ab h ducta cadet . At si fieri potest , non cadat  
 in  $\chi$  : sed in aliud ipsius punctum  $\omega$  : & ab x ad m s  
 perpendicularis ducatur x  $\downarrow$  . Quoniam igitur li- 29 primi.  
 neæ x  $\downarrow$  ,  $\chi$  y  $\phi$  perpendiculares ad m s inter sese  
 æquidistant , triângula s x  $\downarrow$  , s y  $\phi$  similia erunt : & ut  
 x s ad y s , ita  $\downarrow$  s ad  $\phi$  s . Sed m s æqualis est ipsi x  
 s , & q s ipsi y s : quòd à centro ad circūferen-  
 tiam ducuntur . ergo ut m s ad q s , ita  $\downarrow$  s , hoc  
 est x z ei æqualis ad  $\phi$  s , hoc est ad  $\chi$  z . & permu-  
 tando , ut m s ad x z , ita q s ad  $\chi$  z . Rursus quo-  
 niam ex iis , quæ proxime demonstrauius , per-  
 pendicularis à puncto h ad subiectum planum in  
 ellipsim cadit , cuius maior diameter o p , minor  
 q r ; & cadit in  $\omega$  , ut posuimus : erit quadratum q s  
 ad quadratum  $\omega$  z , ut p s o rectangulum ad rectan-  
 gulum p z o , ex uigesima prima primi conicorum .  
 Sed ex eadem ut rectangulum p s o ad ipsum p z o ,  
 ita est quadratum m s ad quadratum x z . ergo 11. quinti.  
 quadratum q s ad quadratum  $\omega$  z : est , ut qua-  
 dratum m s ad ipsum x z . & idcirco linea q s 22. sexti.  
 ad lineam  $\omega$  z , ut linea m s ad x z . ostensum est  
 autem lineam q s ad  $\chi$  z esse , ut m s ad x z . qua  
 re  $\omega$  z ipsi  $\chi$  z æqualis erit , totum parti ; quod  
 fieri non potest . perpendicularis igitur ab h ca-  
 dit in punctum  $\chi$  . eodem modo sumptis aliis pun


X ctis



# DE HOROLOGIORVM

etis in circunferentia circuli  $abcd$ , inueniemus  
quo loco  
perpendi-  
diculares  
ab ipsis  
ductæ in  
planum  
cadant.  
atque il-  
lud est,  
quod fa-  
cere oportebat.

Ex iam  
demon-  
stratis  
manifeste patet modus describendæ ellipsis,  
cuius diametri datæ sint.



His enim ita aptatis, ut sese bifariam, & ad re-  
ctos angulos secent, ex centro quidem sectionis  
puncto, interuallo autem utriusque semidia-  
metrorum circuli describantur, diuidanturq; in  
quotlibet partes proportionales: deinde per diui-  
sionum puncta rectæ lineæ ducantur, quæ in ma-  
iori quidem circulo, diametro minori ellipsis, in  
minori uero maiori æquidistant. atque ubi coie-  
rint quæque duæ, quæ per diuisiones sibi respon-  
dentes



dentes transeunt, puncta notentur, cadent ea in ellipsim, ut ostensum est. Quare si postremo lineam apposite, congruenterque eiusmodi puncta coniungentem duxerimus, ellipsim iam descriptam comperiemus: quod faciendum proponebatur.

Dato plano ad meridianum inclinato, quos arcus ex circulis parallelis illud abscindat, inuestigare.


Sit meridianus circulus  $abcd$  circa centrum  $e$ , in quo ducantur diametri omnium parallelorum cum suis semicirculis; diameterque horizontis, ac uerticis Romæ: & semicirculi in proprias portiones diuidantur, ut in analemmate, quod à principio construximus. Sit autem  $\alpha\gamma$  plani dati, & meridiani ipsius communis sectio, quam secet ad rectos angulos alia diameter  $\beta\delta$ : & intelligatur in eodem plano circulus descriptus ex centro  $e$ , & interuallo  $e\alpha$ : itemque supra  $\beta\delta$  semicirculus ad meridianum rectus. deinde ab eo puncto plani inclinati, in quo semicirculi arcum secat, demittatur perpendicularis ad meridianum in  $\zeta$ . Si igitur ab aliis punctis circumferentiæ circuli inclinati ad idem planum perpendiculares ducantur, cadent omnes in ellipsim, ut demonstratum est; cuius maior diameter  $\alpha\gamma$ , minor dupla ipsius  $e\zeta$ , hoc est  $e\zeta$ . Itaque circa diametros  $\alpha\gamma$ ,  $e\zeta$  describatur ellipsis, quæ secet  $fk$ , diametrum scilicet paralleli Cæcri, & Capricorni in  $\eta\theta$ ; diametrum paralleli

X ii Tauri



8 DE HOROLOGIORVM

Tauri & Scorpii gl in  $\iota\kappa$ : diametrum a c æqui-  
noctialis in  $\lambda\mu$ : denique diametrum Sagittarii &  
Geminorum h m in  $\nu\xi$ . à quibus punctis perpen-



diculares ducantur ad proprios semicirculos  $\eta\theta$ ,  $\pi$ ,  
 $\iota\rho$ ,  $\kappa\sigma$ ,  $\lambda\tau$ ,  $\mu\nu$ ,  $\nu\phi$ ,  $\xi\chi$ . quare per ea, quæ de-  
monstrata sunt, dictum planum ex portione qui-  
dem



dem paralleli Cancrī abscindet arcum  $u o$ , ex portione Capricorni  $u \pi$ , ex portione Tauri  $x \rho$ , Scorpii  $x \sigma$ , Arietis  $d \tau$ , Libræ  $d \nu$ , Sagittarii  $y \phi$ , & Geminorū  $y \chi$ . qui arcus scilicet inter horizon-tem Romæ, & planum inclinatum interiiciuntur. Inuēti igitur erunt arcus circularū parallelorum, quos planum ad meridianum inclinatum abscindit. quod quidem fecisse oportebat.


Dato plano ad meridianum inclinato, quanta sit poli altitudo supra ipsum, deprehendere.

Sit planum ad meridianum inclinatum, cuius & meridiani communis sectio  $a \gamma$ , idem, de quo proxime diximus: describaturq; in eo & circulus circa diametrum  $a \gamma$ , & ellipsis, quam ex altera parte meridiani ad ipsum inclinati circumferentia designat. eadem enim erit, quæ supra: cum inclinatio sit eadem. deinde sumatur circumferentia  $\gamma h$  æqualis circumferentiæ meridiani, quæ inter  $\gamma$  & polum mundi arcticum interiicitur: & ab  $h$  ducatur  $h K$  minori ellipsis diametro  $f g$  æquidistans, quæ ellipsem secet in  $K$ . erit igitur  $K$  punctum illud, in quod perpendicularis à polo in planum demissa cadit. descripto nanque circulo ex centro  $e$ , & interuallo  $e f$ , si iungatur  $e h$ , quæ ipsum secet in  $l$ ; & per  $l$  ducatur linea ipsi  $a \gamma$  æquidistans; conueniet cum linea  $h K$  in puncto  $K$  ellipsis, ut patet ex iis, quæ demonstrauius. postremo per  $K$  & centrum



## DE HOROLOGIORVM

centrum e ducta linea m k en rursus à puncto k ipsi m n perpendicularis k o ad circuli circumferentiam pertineat. Itaque cum perpendicularis à polo ad cuiuslibet horizontis planū cadat in communem sectionem ipsius ac meridiani, erit m n linea meridian a plani inclinati instar horizontis:




& circumferentia m γ, æqualis meridiani circumferentiæ, quæ poli altitudinem dimetitur. manifestum igitur deprehensa erit altitudo poli supra planum ad meridianum inclinatum: id quod facere oportebat.

Itaque



DESCRIPTIONE. 84

Itaque horologia in plano ad horizontem & meri-  
dianum inclinato descripturi, primum altitudinē  
poli supra ipsum inueniemus, & quos arcus ex sin-  
gulis parallelis abscindat: deinde analemma ad  
ipsum, tanquam ad horizontem alterum consti-  
tuemus.




Sit enim meridianus circulus  $a b c d$ , cuius cen-  
trum  $e$ : & diameter  $a c$  ipsius & plani, seu hori-  
zontis inclinati communis sectio:  $b d$  communis  
sectio eiusdem, ac uerticulis: & ducantur diame-  
tri



# DE HOROLOGIORVM

tri parallelorum, ita ut arcus altitudinis poli sit æqualis ipsi  $m o$ . eodem nanque plano ad hoc utemur, de quo ante dictum est. Sit autem diameter Cancrī, & Capricorni  $f g$ , quæ secet ipsam  $a c$  in  $h$ . Præterea Cancrī, & Capricorni parallelus secundum describatur circa eandem diametrum  $f g$ ,




ut sit  $f h$  portio diametri Cancrī,  $h g$  Capricorni: & per  $h$  ipsi  $f g$  perpendicularis ducatur, quæ secet circuli circumferentiam in punctis  $K l$ . erit  $K h l$  communis sectio paralleli eius, & horizontis inclinati. incipientes igitur à puncto  $k$  notabimus  
in por-



DESCRIPTIONE. 85

in portione Kf l horarum diuisiones, quæ subse-  
quuntur arcum u o paralleli Cancrī ab ipso pla-  
no abscissum. in portione uero Kgl diuisiones  
earum, quæ sunt post arcum u π paralleli Capri-  
corni: nam dum sol percurrit eos arcus, qui in-  
teriiciuntur inter horizontem Romæ, & dictum



planum, gnomonis umbra supra ipsum non cadit,  
ex ea parte, quæ spectat ad arcticum polum, sed  
ex parte opposita; in qua etiam horologium, ut in  
aliis, describere licebit. deinde à singulis diuisioni-  
bus perpendiculares ad diametrum fg ducen-  
tes,

Y




## DE HOROLOGIORVM

tes, transferemus puncta ab ipsis facta ad diametrum, quæ est in analemmate. Rursus pro alio horologio exordientes à puncto l designabimus in eodem parallelo, & in portione lg k arcum Cancrī ou: & in portione lf k arcum Capricorni π u, unumquenque cum propriis diuisionibus. à quibus perpendiculares itidem ad diametrum ducemus, puncta in analemma ipsum transferentes. eadem omnia faciemus in circulo æquinoctiali, & in aliis parallelis. nos tamen ne alterum analemma describere cogeremur, in eodem duas diametros Cancrī & Capricorni apposuimus; alteram pro horologio, quod ad polum arcticum spectat; alteram pro eo, quod ad antarcticum. Postremo ad singulas horas inuentis circumferentiis descensiuis, & horizontalibus, horologia efficiemus, quæ in subiectis figuris apparebunt.



DESCRIPTIONE. 86

HOROLOGIVM ANTIQVVM, QVOD AD  
ANTARCTICVM POLVM SPECTAT.




Y ii




# 33 DE HOROLOGIORVM

DA HOROLOGIVM ANTIQVVM AD  
ARCTICVM POLVM.





HOROLOGIVM ASTRONOMICVM AD POLVM  
ANTARCTICVM SPECTANS.






18 DE HOROLOGIORVM


MYJOT GA MYJIMONOTIA MYJOTIA

HOROLOGIVM ASTRONOMICVM  
AD POLVM ARCTICVM.






HOROLOGIVM ITALICVM SPECTANS  
AD POLVM ANTARCTICVM.





88 DE.HOROLOGIORVM

HOROLOGIVM ITALICVM AD  
POLVM ARCTICVM.






DESCRIPTIONE. 89

De uerticalibus inclinatis.

Verticalia inclinata appellamus horologia, quæ  
in planis ad horizontem quidem rectis, ad uerti-




calem uero & meridianum inclinatis efficiuntur;  
qualia sunt plana descensuum circularum. Po-  
namus unum aliquod eiusmodi planū à uerticali  
Z cir-



8 DE HOROLOGIORVM

circulo declinare gradibus 43, in quo horologia  
describenda sint. declinabit idem à meridiano gra-  
dibus 47. Itaque primum inuestigabimus, quos  
arcus ex circulis parallelis abscindat; & quanta sit  
poli supra ipsum altitudo, per ea, quæ supra demõ




strata sunt. Sit enim meridianus circulus a b c d  
cum aliis diametris, & semicirculis, ut in analem  
mate, cuius, & plani inclinati communis sectio sit  
ipsa p q, eadem, quæ uerticalis diameter. Si igitur  
pro inclinatione eius in meridiani plano ellip-  
psis



DESCRIPTIONE. 90


psis describatur; arcuū abscissorū quantitas; & rur-  
sus si in plano inclinato describatur eadē ellipsis, al-  
titudo poli manifesta erit. cōstruatur deinde ana-  
lemma ad idem planum, uelut ad horizontem:  
atque in eo, quemadmodū in plano ad horizontē  
inclinato ante docuimus, horologia efficiantur.



Z ii




# DE HOROLOGIORVM





DESCRIPTIONE. 91


HOROLOGIVM ANTIQVVM, QVOD AD  
ORIENTEM SOLEM SPECTAT.






# DE HOROLOGIORVM

HOROLOGIVM ANTIQVVM AD  
ORIENTEM SPECTANS.






HOROLOGIVM ASTRONOMICVM  
AD SOLIS ORTVM.






# DE HOROLOGIORVM

HOROLOGIVM ASTRONOMICVM  
AD OCCASVM.





HOROLOGIVM ITALICVM AD  
ORIENTEM SPECTANS.




&



DE HOROLOGIORVM

HOROLOGIVM ITALICVM  
AD OCCIDENTEM.





# INDEX RERVM

## ET VERBORVM,

QVAE IN HOC LIBRO CONTINENTVR.

ACCEPTIONES angulorum, & circunferen-  
A tiarum quo modo fiant. 10. b. 11. 12. 15.  
16. 17. 18. 25. usque ad 34. 38. usque ad 42  
Aequinoctialis diameter. 3. 6. b.

Analemma quid sit. 2.

Analemmatis descriptio 33. usque ad 38. 49. 50. 51.

Angulus in plano æquinoctialis 4. b. 45. b.

Anguli in æquinoctiis iidem sunt, qui in plano æqui-  
noctialis. 12. b.

Anguli in plano æquinoctialis acceptio. 16. 20. 22.

Angulorum & circunferentiarum acceptiones. Vide  
supra, Acceptiones.

Angulorum & circunferentiarum consequentia ocu-  
lis subiecta. 5. 7. 8. 9.

Angulus in plano uerticulis. 4. 6. 8. 45. b.

Antiscius angulus. 4. b. 8. 45. b.

Antiscia circunferentia apud antiquos. 6.

Circunferentia in æquinoctialis plano apud antiquos,  
Ptolemæo est hætemoria. 6.

Circunferentiæ in æquinoctialis plano acceptio ex  
analemmate. 42.

Circunferentiæ singulorum circularum, quæ sint. 5.  
6. 7. 8. 9. 10.

Circunferentiarum nomina unde. 9.

Circunferentiarum acceptiones, uide supra, acceptiones.

Conicæ sectiones. 56. b.

Conicarum sectionum descriptio. 58. b. 59. 81.

& ii Descen-



Descensiuus circulus. 4. 6. b.  
 Descensiu circuli anguli. 4. b. 7. b.  
 Descensiu angulus apud Ptolemæum. 4. b. 45. b.  
 Descensiu angulus apud antiquos. 4. b. 8. 45. b.  
 Descensiu anguli acceptio. 16. 17. 20.  
 Descensua circumferentia. 5. b. 9. b.  
 Descensua circumferentia apud antiquos 6. b.  
 Descensua circumferentia quo modo ex analemma-  
 te accipiat. 39. b. 41.  
 Diei quantitas ex analemmate. 51. b.  
 Dimensiones tres tantum esse, & cur. 1. 2.  
 Ellipsis descriptio. 58. b. 59. 81.  
 Gnomon. 3. 6. b.  
 Gnomon horarum index. 32.  
 Hectemorios circulus. 4. 5. 7.  
 Hectemorii circuli anguli. 4. 6. 9.  
 Hectemorii angulus. 4. 9. 45. b.  
 Hectemorii anguli acceptio 13. 14. 16. 17. 20.  
 Hectemorii circumferentia. 5. b. 6. 9. b.  
 Hectemorii circumferentia acceptio. 39. 41.  
 Horarius circulus. 4. 6. b.  
 Horarii circuli anguli. 4. b. 8.  
 Horarii angulus. 4. 6. 8. 45. b.  
 Horarii anguli acceptio. 16. 17. 18. 20.  
 Horarii circumferentia. 5. b. 6. 9. b.  
 Horarii circumferentia quomodo ex analemmate ac-  
 cipiatur. 39. b. 41.  
 Horizon. 3.  
 Horizō mobilis à Ptolemæo hectemorios dicitur. 6. b.  
 Horizontis angulus. 10. b.  
 Horizontis anguli acceptio. 16. 18. 20.  
 Horizontis circumferentia. 6. 9. b.  
 Horizontis circumferentia quo modo ex analemma-  
 te



te accipiatur. 40.41.  
 Horologia horizontalia. 52.77.b.  
     verticalia. 65.89.  
     meridiana. 69.b.  
     æquinoctialia. 73.b.  
 Horologii planum. 52.b.  
 Horizontalia horologia. 52.  
 Horizontalia inclinata. 75.b.  
 Hyperboles descriptio. 58.b.59.  
 Meridianus circulus. 3.  
 Meridiana diameter. 3.6. b.  
 Meridianus mobilis horarius appellatur. 6.b.  
 Meridiani angulus. 10.b.45.b.  
 Meridiani anguli acceptio. 16.19.20.  
 Meridiani circumferentia. 5.b.6.9.  
 Meridiani circumferentia ex analemmate quo modo  
     accipiatur. 39.b.41.  
 Meridiana horologia. 69.b.  
 Parabola descriptio. 59.  
 Verticalis circulus. 3.  
 Verticalis angulus. 10.b.45.b.  
 Verticalis mobilis descensus dicitur. 6.b.  
 Verticalis anguli acceptio. 16.17.18.20.  
 Verticalis circumferentia. 5.6.9.b.  
 Verticalis circumferentia quo modo ex analemmate  
     accipiatur. 40.41.b.  
 Verticalia horologia. 65.  
 Verticalia inclinata. 89.

F I N I S.



# ERRATA.

## Delenda

## Reponenda

Fol. 5. uer. 20. orientalis	orientales
14: 28. em x. & quare	em x. quare
16. 25. g k t d	g k i d
18: 4. ge	g c
24: 26. eq	c q
28. 6. pes	p s e
30. 4. et	e r
32: 17. x e o	y e o
33: 4. 69021	68021
38: 19. indueretur	induceretur
39: 18. peripheria	peripheriam
52. 25. orizontis	horizontis
53. 27. diximus, A C G H	diximus, G H
56: 22. quosque	quousque
69. 11. superioribus	superioribus
62: 15. a i c x	a i c k
19. i x	i k
20. i e l, x e m	i e l, k e m
66: 5. e o, æquales	e o, quæ sint æquales
70. 26. sectio, in qua	sectio, qua
74: 9. a γ	α γ
76. 9. Octauæ	octauæ.



pagina 48, pro impressa figura hanc repone.

CANCRI PRINCIPII, HORARVM XIII.

horæ horizon- tis.	hele- mo- rie	horarie	Descen- sive	meridia ne	Vertica les	horizon- tales
	24 15	65 5	90 0	0 0	90 0	24 15
Bo.1 11	25 15	69 15	75 10	35 15	69 50	20 0
Bo.2 10	34 20	73 0	60 55	60 45	60 0	18 50
Bo.3 9	46 50	77 30	46 5	72 10	45 5	17 15
Bo.4 8	60 10	79 10	31 0	78 30	30 10	18 0
Bo.5 7	75 0	81 20	17 30	81 30	15 10	27 0
Bo. me- ridies	90 0	82 35	7 25	82 35	0 0	90 0

Folio.59. in figuris impressis pro x repone y.  
69.b. inuersa est impressa figura.

005363868































15. f